

Alumno/a: SOLUCIONES

1. Resolver:

(2,25 puntos)

a) $(2x-6)(x^2-4)(x^2+2)=0$

$$\begin{cases} 2x-6=0; 2x=6; \boxed{x=3} & 0.25 \\ x^2-4=0; x^2=4; \boxed{x=\pm 2} & 0.25 \\ x^2+2=0; x^2=-2 & \text{No soluc.} & 0.25 \end{cases}$$

b) $3x^2+4x-4=0$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 3 \cdot (-4)}}{6} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 48}}{6} = \frac{-4 \pm \sqrt{64}}{6} = \frac{-4 \pm 8}{6}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{4}{6} = \boxed{\frac{2}{3}} & 0.25 \\ x_2 = \frac{-12}{6} = \boxed{-2} & 0.25 \end{cases}$$

b) $(x-1)(4x-2)=2(x^2-1)-(1-x)(x-2)$

$$4x^2 - 2x - 4x + 2 = 2x^2 - 2 - (x - 2 - x^2 + 2x)$$

$$4x^2 - 6x + 2 = 2x^2 - \cancel{-x} + \cancel{2} + x^2 - 2x$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \quad 0.25$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 2}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8}}{2} = \frac{3 \pm 1}{2}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{4}{2} = \boxed{2} & 0.25 \\ x_2 = \frac{2}{2} = \boxed{1} & 0.25 \end{cases}$$

2,25
(0,75 cada opdo.)

2. Resolver, por el método que se indica:

(2,25 puntos)

a) (Por sustitución) $\begin{cases} 2x - y = 2 \\ 3x + 3y = 21 \end{cases} \rightarrow 2x - 2 = y (*)$

$$\downarrow$$

$$3x + 3(2x - 2) = 21$$

$$3x + 6x - 6 = 21$$

$$9x = 27$$

$$\boxed{x=3} \quad 0.25$$

sustituimos en (*) $\rightarrow \boxed{y=4} \quad 0.5$

b) (Por igualación) $\begin{cases} 3x - y = -9 \\ 2x + y = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 3x + 9 = y \quad (*) \\ y = -2x - 1 \end{cases} \rightarrow 3x + 9 = -2x - 1$
 $5x = -10$
 $x = -2$ (0.25) $\xrightarrow{\text{sustituimos en } (*)}$ $y = 3$ (0.5)

$\boxed{2,25}$
 (0,75 cada eqto.)

c) (Por reducción) $\begin{cases} 3x - 5y = 4 \\ (*) 2x - y = 5 \end{cases} \xrightarrow{\cdot -5} \begin{cases} 3x - 5y = 4 \\ -10x + 5y = -25 \end{cases}$
 $-7x = -21$
 $x = 3$ (0.25) $\xrightarrow{\text{sustituimos en } (*)}$ $6 - y = 5; 6 - 5 = y$
 $y = 1$ (0.5)

3. Miguel tiene 4 años más que su primo Ignacio y, dentro de 3 años, entre los dos sumarán 20 años. ¿Cuántos años tiene cada uno? (NOTA: No vale resolverlo por tanteo, sino planteando una ecuación o sistema) (1,75 puntos)

	EDAD DE MIGUEL	EDAD DE IGNACIO
HOY	x	y
DENTRO DE 3 AÑOS	x + 3	y + 3

planteamiento: 0,5
 $\rightarrow x = 4 + y \quad (*)$
 $\rightarrow (x + 3) + (y + 3) = 20$
 por sustitución:
 $4 + y + 3 + y + 3 = 20$

$\boxed{1,75}$

comprobación: Miguel tiene 9 años, es decir, 4 más que Ignacio que tiene 5.
 Dentro de 3 años ambos tendrán 8 y 12 años, que suman 20.


0.25/

resolución: !
 $2y = 10$
 $y = 5$ años tiene Ignacio

$\downarrow$ sustituyendo en (*)
 $x = 9$ años tiene Miguel

4. a) Hallar x (con dos decimales, bien aproximados):


(2 puntos)



$12^2 = 10^2 + x^2$
 $144 = 100 + x^2$
 $44 = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{44} \approx 6,63 \text{ cm}$
 (0.25) (0.5)

(se descontará 0,125 por: tener mal las unidades, no usar el símbolo $\approx$, decimales mal aproximados)

- b) Dibujar aproximadamente un triángulo equilátero de 15 cm de perímetro y hallar su altura (con dos decimales, bien aproximados).



$$p = 15 \text{ cm} \Rightarrow \text{lado} = \frac{15}{3} = 5 \text{ cm}$$

2

(0,75 + 1,25)


$$5^2 = h^2 + 2,5^2$$

$$25 = h^2 + 6,25$$

$$18,75 = h^2 \Rightarrow h = \sqrt{18,75} \approx 4,33 \text{ cm}$$

5. a) Dibujar aproximadamente un rombo de diagonales 9 y 12 cm, y hallar su área.

(1,5 puntos)




$$A = \frac{D \cdot d}{2} = \frac{9 \cdot 12}{2} = 54 \text{ cm}^2$$

1,5

(0,75 cada apdo.)

- b) Dibujar aproximadamente un trapecio isósceles de bases 12 y 8 cm, y altura 5 cm, y hallar su área.



$$A = \frac{B+b}{2} \cdot h = \frac{12+8}{2} \cdot 5 = 50 \text{ cm}^2$$

ORTOGRAFÍA, SINTAXIS, CALIGRAFÍA: 0,05

ORDEN PLANTAMIENTO Y LIMPIEZA: 0,10

CORRECCIÓN LENGUAJE MATEMÁTICO: 0,10

TOTAL: 0,25