PRUEBA DE ACCESO (LOGSE)**UNIVERSIDAD DE VALENCIA****JUNIO - 2004**

(RESUELTOS por Antonio Menguiano)

MATEMÁTICAS II**Tiempo máximo: 2 horas**

Se elegirá el Ejercicio A o el B, del que sólo se harán tres de los cuatro ejercicios. En ningún caso se podrá elegir simultáneamente el problema 4º-1 y el problema 4º-2.

Cada problema se puntuará de 0 a 3'3, según la puntuación máxima indicada en cada apartado. La suma de las puntuaciones mas 0'1 será la calificación de esta prueba.

Cada estudiante deberá disponer de una calculadora científica o gráfica para el examen. Se prohíbe su utilización indebida (para guardar fórmulas en memoria).

EJERCICIO A

1º) Dado el sistema de ecuaciones lineales
$$\left. \begin{array}{l} x - y + z = \lambda \\ \lambda x + 2y - z = 3\lambda \\ 2x + \lambda y - 2z = 6 \end{array} \right\},$$
 con λ parámetro real, se

pide:

a) Determinar razonadamente para qué valores de λ es compatible determinado, compatible indeterminado e incompatible.

b) Hallar el conjunto de soluciones del sistema para el caso compatible determinado.

c) Hallar el conjunto de las soluciones del sistema para el caso compatible indeterminado.

a)

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ \lambda & 2 & -1 \\ 2 & \lambda & -2 \end{pmatrix} \quad ; ; \quad M' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & \lambda \\ \lambda & 2 & -1 & 3\lambda \\ 2 & \lambda & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$|M| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ \lambda & 2 & -1 \\ 2 & \lambda & -2 \end{vmatrix} = -4 + \lambda^2 + 2 - 4 + \lambda - 2\lambda = 0 \quad ; ; \quad \lambda^2 - \lambda - 6 = 0 \quad ; ;$$

$$\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 3 \\ \lambda_2 = -2 \end{cases}$$

Para $\begin{cases} \lambda \neq 3 \\ \lambda \neq -2 \end{cases} \Rightarrow \text{Rango } M = \text{Rango } M' = 3 = n^\circ \text{ incógnitas} \Rightarrow \text{Compatible det er min ado}$

Para $\lambda = 3$ resulta $M' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & 9 \\ 2 & 3 & -2 & 6 \end{pmatrix}$, que como puede observarse, tiene la

cuarta columna proporcional a la primera con lo cual resulta que:

Para $\lambda = 3 \Rightarrow \text{Rango } M = \text{Rango } M' = 2 < n^\circ \text{ incógnitas} \Rightarrow \text{Compatible in det er min ado}$

Para $\lambda = -2$ resulta $M' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & -6 & -6 \\ 2 & -2 & 6 & 6 \end{pmatrix}$. El rango de M' es:

$$|M'| \Rightarrow \{C_1, C_2, C_4\} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -2 & 2 & -6 \\ 2 & -2 & 6 \end{vmatrix} = 0 \quad \{C_1 = -C_2\} \Rightarrow \underline{\text{Rango } M' = 3}$$

Para $\lambda = -2 \Rightarrow \text{Rango } M \neq \text{Rango } M' \Rightarrow \text{Incompatible}$

b)

Vamos a resolverlo para compatible determinado. Aplicando Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 1 \\ 3\lambda & 2 & -1 \\ 6 & \lambda & -2 \end{vmatrix}}{\lambda^2 - \lambda - 6} = \frac{-4\lambda + 3\lambda^2 + 6 - 12 + \lambda^2 - 6\lambda}{(\lambda - 3)(\lambda + 2)} = \frac{4\lambda^2 - 10\lambda - 6}{(\lambda - 3)(\lambda + 2)} = \frac{(\lambda - 3)(4\lambda + 2)}{(\lambda - 3)(\lambda + 2)} =$$

$$= \frac{2(2\lambda + 1)}{\lambda + 2} = x$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 3\lambda & -1 \\ 2 & 6 & -2 \end{vmatrix}}{\lambda^2 - \lambda - 6} = \frac{-6\lambda + 6\lambda - 2\lambda - 6\lambda + 6 + 2\lambda^2}{(\lambda - 3)(\lambda + 2)} = \frac{2\lambda^2 - 8\lambda + 6}{(\lambda - 3)(\lambda + 2)} = \frac{2(\lambda - 3)(\lambda - 1)}{(\lambda - 3)(\lambda + 2)} =$$

$$= \frac{2(\lambda - 1)}{\lambda + 2} = y$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & \lambda \\ \lambda & 2 & 3\lambda \\ 2 & \lambda & 6 \end{vmatrix}}{\lambda^2 - \lambda - 6} = \frac{12 + \lambda^3 - 6\lambda - 4\lambda - 3\lambda^2 + 6\lambda}{(\lambda - 3)(\lambda + 2)} = \frac{\lambda^3 - 3\lambda^2 - 4\lambda + 12}{(\lambda - 3)(\lambda + 2)} =$$

$$= \frac{(\lambda - 3)(\lambda + 2)(\lambda - 2)}{(\lambda - 3)(\lambda + 2)} = \underline{\underline{\lambda - 2 = z}}$$

c)

Para compatible indeterminado: $\lambda = 3$. El sistema resultante es:

$$\left. \begin{array}{l} x - y + z = 3 \\ 3x + 2y - z = 9 \\ 2x + 3y - 2z = 6 \end{array} \right\} . \text{ Despreciando la última ecuación y parametrizando, por ejemplo, } z:$$

$$\left. \begin{array}{l} x - y + z = 3 \\ 3x + 2y - z = 9 \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{z = t} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} x - y = 3 - t \\ 3x + 2y = 9 + t \end{array} \right\} ; ; \left. \begin{array}{l} 2x - 2y = 6 - 2t \\ 3x + 2y = 9 + t \end{array} \right\} \Rightarrow 5x = 15 - t ; ;$$

$$\underline{\underline{x = 3 - \frac{1}{5}t}} ; ; \left. \begin{array}{l} -3x + 3y = -9 + 3t \\ 3x + 2y = 9 + t \end{array} \right\} \Rightarrow 5y = 4t ; ; \underline{\underline{y = \frac{4}{5}t}}$$

Las infinitas soluciones se obtienen dando valores a t en la siguiente expresión:

$$\underline{\underline{\left\{ \begin{array}{l} x = 3 - \frac{1}{5}t \\ y = \frac{4}{5}t \\ z = t \end{array} \right.}}$$

2º) Dados los planos $\pi_1 \equiv x + y + z = -5$; $\pi_2 \equiv x - 3y - z = 3$ y la recta r dada por sus ecuaciones continuas: $r \equiv \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{2}$, se pide:

a) Determinar razonadamente la posición relativa de la recta r y la recta s intersección de los planos π_1 y π_2 .

b) Obtener razonadamente la ecuación del plano π que contiene a la recta s y es paralelo a la recta r.

a)

La recta s expresada por unas ecuaciones implícitas es: $s \equiv \begin{cases} x + y + z + 5 = 0 \\ x - 3y - z - 3 = 0 \end{cases}$.

Parametrizando z: $\begin{cases} x + y = -5 - z \\ x - 3y = 3 + z \end{cases} \Rightarrow \underline{z = k} \Rightarrow \begin{cases} x + y = -5 - z \\ -x + 3y = -3 - z \end{cases} ; ; 4y = -8 - 2z$

$$\underline{y = -2 - \frac{1}{2}k} ; ; \begin{cases} 3x + 3y = -15 - 3z \\ x - 3y = 3 + z \end{cases} ; ; 4x = -12 - 2z ; ; \underline{x = -3 - \frac{1}{2}k} \Rightarrow s \equiv \begin{cases} x = -3 - \frac{1}{2}k \\ y = -2 - \frac{1}{2}k \\ z = k \end{cases}$$

Los vectores directores de las rectas r y s pueden ser, respectivamente los siguientes: $\vec{u} = (2, 3, 2)$ y $\vec{v} = (1, 1, -2)$.

Por ser los vectores directores linealmente independientes, las rectas r y s se cruzan o se cortan. Para diferenciar el caso tomamos un vector $\vec{w}$ que tenga como origen el punto de la recta r, A(2, 1, 0) y como extremo el punto de la recta s, B(-3, -2, 0):

$$\vec{w} = \vec{AB} = B - A = (-3, -2, 0) - (2, 1, 0) = \underline{(-5, -3, 0)} = \vec{w}.$$

El rango que forman los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ es el siguiente:

$$\text{Rango } \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\} \Rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -5 & -3 & 0 \end{vmatrix} = -6 + 30 + 10 - 12 = 40 - 18 = 22 \neq 0 \Rightarrow \underline{\text{Rango} = 3}$$

Por tener los vectores rango 3 están situados en distintos planos lo cual significa que las rectas r y s se cruzan.

b)

Para obtener la ecuación del plano π que contiene a la recta s y es paralelo a la recta r , tomamos como vectores directores del plano los vectores directores de las rectas y como punto, un punto de s , que puede ser $B(-3, -2, 0)$:

$$\pi(B; \vec{u}, \vec{v}) \equiv \begin{vmatrix} x+3 & y+2 & z \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0 \quad ;;$$

$$-6(x+3) + 2z + 2(y+2) - 3z - 2(x+3) + 4(y+2) = 0 \quad ;;$$

$$-8(x+3) + 6(y+2) - z = 0 \quad ;; \quad -8x - 24 + 6y + 12 - z = 0$$

$$\underline{\underline{\pi \equiv 8x - 6y + z + 12 = 0}}$$

3º) Encontrar razonadamente el punto de la curva $y = \frac{1}{1+x^2}$ en el que la recta tangente a la curva tiene pendiente máxima y calcular el valor de esta pendiente.

La tangente a una curva en un punto es el valor de la derivada en ese punto.

$$\text{La derivada de la función es: } y' = \frac{-1 \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}.$$

La pendiente (derivada de la función) es máxima cuando su derivada (segunda derivada) es cero:

$$y'' = \frac{-2 \cdot (1+x^2)^2 - (-2x) \cdot 2(1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \frac{-2(1+x^2) + 8x^2}{(1+x^2)^3} = \frac{-2 - 2x^2 + 8x^2}{(1+x^2)^3} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 2 = 0 \quad ; ; \quad 3x^2 = 1 \quad ; ; \quad x^2 = \frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad \underline{x_1 = +\frac{1}{\sqrt{3}}} \quad ; ; \quad \underline{x_2 = -\frac{1}{\sqrt{3}}}$$

Para justificar que se trata de un máximo hemos de calcular la tercera derivada:

$$y'' = \frac{6x^2 - 2}{(1+x^2)^3} \quad ; ; \quad y''' = \frac{12x \cdot (1+x^2)^3 - (6x^2 - 2) \cdot 3(1+x^2)^2 \cdot 2x}{(1+x^2)^6} =$$

$$= \frac{12x \cdot (1+x^2) - 6x(6x^2 - 2)}{(1+x^2)^4} = \frac{12x + 12x^3 - 36x^3 + 12x}{(1+x^2)^4} = \frac{-24x^3 + 24x}{(1+x^2)^4} = \frac{24x(1-x^2)}{(1+x^2)^4} = y''''$$

$$y'''' = \frac{24x(1-x^2)}{(1+x^2)^4} \Rightarrow \begin{cases} y'''' \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{24 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{1}{3} \right)}{+} = \frac{+}{+} > 0 \Rightarrow \underline{\text{Mínimo}} \\ y'''' \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{-24 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{1}{3} \right)}{+} = \frac{-}{+} < 0 \Rightarrow \underline{\text{Máximo}} \end{cases}$$

El valor de la máxima pendiente es:

$$m = y' \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{-2 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right)}{\left[1 + \left(-\frac{1}{3} \right) \right]^2} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\left(1 + \frac{1}{3} \right)^2} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\left(\frac{3+1}{3} \right)^2} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\frac{16}{9}} = \frac{18}{16\sqrt{3}} = \frac{9}{8\sqrt{3}} = \underline{\underline{\frac{3\sqrt{3}}{8}}} = m$$

4º-1) En un plano, el trazado de una carretera discurre según la ecuación $y = \frac{x^2}{4} - x$, siendo un río el eje OX. En el terreno entre el río y la carretera hay un pinar. Si expresamos las distancias en kilómetros, ¿cuánto vale el pinar si la hectárea se paga a 60 euros?

Los puntos de corte de la parábola $y = \frac{x^2}{4} - x$ con los ejes son:

Eje OX: $x=0 \rightarrow \underline{O(0, 0)}$

Eje OY: $y=0 \;; \; \frac{x^2}{4} - x=0 \;; \; x^2 - 4x=0 \;; \; x(x-4)=0 \rightarrow \underline{O(0, 0)}$ y $\underline{A(4, 0)}$

La situación aproximada de la situación es la que indica la siguiente figura:

El área del pinar es:

$$S = \int_0^4 \left(\frac{x^2}{4} - x \right) \cdot dx = \left[\frac{x^3}{12} - \frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 0 - \left(\frac{64}{12} - \frac{16}{2} \right) = -\frac{16}{3} + 8 = \frac{24-16}{3} = \frac{8}{3} \text{ Km}^2 = S$$

El precio del pinar es:

$$P = S(\text{Ha}) \cdot 60 = \left(\frac{8}{3} \cdot 100 \right) \text{ Ha} \cdot 60 = 800 \cdot 200 = \underline{\underline{16000 \text{ euros} = \text{Precio}}}$$

4°-2) La media de las calificaciones globales obtenidas por 10 alumnos fue 6'8 puntos y sus horas de estudio totales sumaron 120. Si x representa las horas de estudio de cada estudiante e y su calificación, el coeficiente de correlación entre x e y es 0'8. Sabiendo que la desviación típica de x coincide con la desviación típica de y , explicar, razonadamente, cómo se obtiene la recta de regresión de y sobre x y calcularla.

La recta de regresión de y sobre x viene dada por la fórmula: $y - \bar{y} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} (x - \bar{x})$, donde $\bar{x}$ e $\bar{y}$ son las medias aritméticas respectivas; σ_{xy} es la covarianza y σ_x es la desviación típica de x .

El coeficiente de variación viene dado por la fórmula: $r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$.

Según los datos del problema, $r = 0'8$ y las desviaciones típicas son iguales, por lo tanto: $r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} = 0'8$.

Sabiendo que $\bar{y} = 6'8$ y que $\sum_{i=1}^{i=10} x_i = 120$: $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{i=10} x_i}{N} = \frac{120}{10} = 12 = \bar{x}$.

Finalmente la recta de regresión resulta:

$$y - 6'8 = 0'8(x - 12) \quad ;; \quad 10y - 68 = 8x - 96 \quad ;; \quad 8x - 10y - 28 = 0 \quad ;; \quad \underline{\underline{4x - 5y - 14 = 0}}$$

EJERCICIO B

1º) Determinar el valor real de x para que se cumpla la siguiente propiedad: el determi-

nante de la matriz 2B es 160, siendo $B = \begin{pmatrix} x & 3 & 1 \\ x+1 & 4 & 2 \\ x & 2-x^2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$|B| = \begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ x+1 & 4 & 2 \\ x & 2-x^2 & 1 \end{vmatrix} = 4x + (x+1)(2-x^2) + 6x - 4x - 2x(2-x^2) - 3(x+1) =$$

$$= 2x - x^3 + 2 - x^2 + 6x - 4x + 2x^3 - 3x - 3 = \underline{x^3 - x^2 + x - 1 = |B|}$$

Teniendo en cuenta que B es una matriz cuadrada de 3 x 3, el valor del determinante de 2B es $2^3 = 8$ veces mayor que el determinante de B, por lo cual:

$$|B| = x^3 - x^2 + x - 1 = \frac{160}{8} = 20 \quad ;; \quad \underline{x^3 - x^2 + x - 21 = 0}.$$

Resolviendo por Ruffini, teniendo en cuenta que las raíces son los divisores del término independiente, o sea, $\pm 1, \pm 3, \pm 7$. Teniendo en cuenta que ± 1 no se cumple:

1	-1	1	21
3	3	6	-21
1	2	7	0
-7	-7	35	
1	-5	$\neq 0$	

$$\underline{\underline{x = 3}}$$

2º) Se considera la recta $r \equiv (x, y, z) = (t + 1, 2t, 3t)$ y el plano $\pi \equiv x - 2y - z = 0$ y el punto $P(1, 1, 1)$. Se pide:

a) Determinar la ecuación del plano π_1 que pasa por P y es paralelo al plano π .

b) Determinar la ecuación del plano π_2 que contiene a la recta r y pasa por P.

c) Calcular unas ecuaciones paramétricas de la recta s intersección de π_1 y π_2 .

a)

La expresión por su ecuación general del plano π_1 es: $\pi_1 \equiv x - 2y - z + D = 0$.

Por contener al punto $P(1, 1, 1)$ tiene que satisfacer su ecuación:

$$1 - 2 \cdot 1 - 1 + D = 0 \quad ; ; \quad 1 - 2 - 1 + D = 0 \quad ; ; \quad -2 + D = 0 \quad ; ; \quad D = 2 \Rightarrow \underline{\underline{\pi_1 \equiv x - 2y - z + 2 = 0}}$$

b)

Una forma de resolver este apartado es la siguiente:

$$\text{Dos puntos de la recta r son: } r \equiv (x, y, z) = (t + 1, 2t, 3t) \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \rightarrow \underline{A(1, 0, 0)} \\ t = 1 \rightarrow \underline{B(2, 2, 3)} \end{cases}$$

Un vector director de la recta r es: $\vec{w} = \overrightarrow{AB} = B - A = (1, 2, 3)$.

El otro vector director necesario del plano π_2 es: $\vec{v} = \overrightarrow{AP} = P - A = (0, 1, 1)$.

$$\pi_2(P; \vec{v}, \vec{w}) \equiv \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0 \quad ; ; \quad 3(x-1) + (y-1) - (z-1) - 2(x-1) = 0 \quad ; ;$$

$$(x-1) + (y-1) - (z-1) = 0 \quad ; ; \quad x-1 + y-1 - z+1 = 0 \quad ; ; \quad \underline{\underline{\pi_2 \equiv x + y - z - 1 = 0}}$$

c)

$$\text{La recta s intersección de } \pi_1 \text{ y } \pi_2 \text{ es: } s \equiv \begin{cases} x - 2y - z + 2 = 0 \\ x + y - z - 1 = 0 \end{cases} .$$

La expresión de s por unas ecuaciones paramétricas se obtienen parametrizando una variable, por ejemplo z:

$$s \equiv \begin{cases} x - 2y - z + 2 = 0 \\ x + y - z - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \underline{z = k} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y = -2 + z \\ x + y = 1 + z \end{cases} ;; \begin{cases} -x + 2y = 2 - z \\ x + y = 1 + z \end{cases} \Rightarrow 3y = 3 ;; \underline{y = 1}$$

$$x + y = 1 + z ;; x + 1 = 1 + k ;; \underline{x = k} \Rightarrow s \equiv \begin{cases} x = k \\ y = 1 \\ z = k \end{cases}$$

3º) Hallar todos los valores reales de z tales que $\int_0^2 \frac{-16}{x^2 - 2x - 15} \cdot dx = L25$.

En primer lugar vamos a resolver la integral indefinida $I = \int \frac{-16}{x^2 - 2x - 15} \cdot dx$:

$$x^2 - 2x - 15 = 0 \quad ; ; \quad x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 60}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{64}}{2} = \frac{2 \pm 8}{2} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = -3 \end{cases}$$

$$\frac{-16}{x^2 - 2x - 15} = \frac{-16}{(x-5)(x+3)} = \frac{A}{x-5} + \frac{B}{x+3} = \frac{Ax + 3A + Bx - 5B}{x^2 - 2x - 15} = \frac{(A+B)x + (3A - 5B)}{x^2 - 2x - 15} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ 3A - 5B = -16 \end{cases} ; ; \begin{cases} -3A - 3B = 0 \\ 3A - 5B = -16 \end{cases} \rightarrow -8B = -16 \quad ; ; \quad \underline{B = 2} \quad ; ; \quad A + 2 = 0 \quad ; ; \quad \underline{A = -2}$$

$$I = \int \frac{-16}{x^2 - 2x - 15} \cdot dx = \int \frac{-2}{x-5} \cdot dx + \int \frac{2}{x+3} \cdot dx = \underline{-2L|x-5| + 2L|x+3| = I}$$

Sustituyendo en el enunciado el valor obtenido de I, resulta:

$$\int_0^2 \frac{-16}{x^2 - 2x - 15} \cdot dx = L25 \quad ; ; \quad [-2L|x-5| + 2L|x+3|]_0^2 = L25 \quad ; ; \quad \left[2L \left| \frac{x+3}{x-5} \right| \right]_0^2 = 2L5 \quad ; ;$$

$$2L \frac{z+3}{z-5} - 2L \frac{3}{-5} = L25 \quad ; ; \quad 2L \frac{z-5}{3} = L25 \quad ; ; \quad 2L \left(-\frac{5z+3}{3z-5} \right) = L25 \quad ; ; \quad L \left(-\frac{5z+3}{3z-5} \right)^2 = L5^2 \quad ; ;$$

$$\frac{25}{9} \cdot \left(\frac{z+3}{5-z} \right)^2 = 25 \quad ; ; \quad (z+3)^2 = 9(5-z)^2 \quad ; ; \quad z^2 + 6z + 9 = 9(25 - 10z + z^2) = 225 - 90z + 9z^2 \quad ; ;$$

$$8z^2 - 96z + 216 = 0 \quad ; ; \quad \underline{z^2 - 12z + 27 = 0}$$

$$z = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 108}}{2} = \frac{12 \pm \sqrt{36}}{2} = \frac{12 \pm 6}{2} \Rightarrow \begin{cases} z_1 = 9 \\ z_2 = 3 \end{cases}$$

Los valores reales de z son 3 y 9

4°-1) Desde un punto N de la orilla del mar, un nadador debe alcanzar una boya que flota a 3 kilómetros de la costa y dista $3\sqrt{5}$ kilómetros del punto N. Si recorriendo la orilla (que se supone recta y plana), su velocidad media es de 5 Km/h y nadando, de 3 Km/h, ¿cuánto tiempo deberá caminar hasta alcanzar el mar, para alcanzar la boya en el menor tiempo posible?

La situación aproximada se refleja en el siguiente esquema:

————— Recorrido andando

----- Recorrido nadando

$$(3\sqrt{5})^2 = 3^2 + \overline{NA}^2 \quad ; ; \quad 45 = 9 + \overline{NA}^2 \quad ; ; \quad \overline{NA} = \sqrt{45 - 9} = \sqrt{36} = 6 \text{ Km} = \overline{NA}.$$

$$\overline{PB}^2 = (6-x)^2 + 3^2 = 36 - 12x + x^2 + 9 = x^2 - 12x + 45 \quad ; ; \quad \overline{PB} = \sqrt{x^2 - 12x + 45}.$$

El tiempo total es el siguiente: $T = \frac{x}{5} + \frac{\overline{PB}}{3} = \frac{x}{5} + \frac{\sqrt{x^2 - 12x + 45}}{3}.$

$$T' = \frac{1}{5} + \frac{2x-12}{6\sqrt{x^2-12x+45}} = 0 \quad ; ; \quad \frac{1}{5} = \frac{12-2x}{6\sqrt{x^2-12x+45}} \quad ; ; \quad 5(6-x) = 3\sqrt{x^2-12x+45} \quad ; ;$$

$$25(36-12x+x^2) = 9(x^2-12x+45) \quad ; ; \quad 900-300x+25x^2 = 9x^2-108x+405 \quad ; ;$$

$$16x^2 - 192x + 495 = 0 \quad ; ; \quad x = \frac{192 \pm \sqrt{36864 - 31680}}{32} = \frac{192 \pm 72}{32} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{264}{32} = \frac{33}{4} = 8'25 \\ x_2 = \frac{120}{32} = \frac{15}{4} = 3'75 \end{cases}$$

La solución de x es 3'75 Km.

(No es posible la solución $x = 8'25$ por ser $\overline{NA} = 6$.)

Con los valores obtenidos se tiene:

$$\text{Tiempo caminando} = \frac{x}{5} = \frac{\frac{15}{4}}{5} = \frac{3}{4} \text{ hora} = \underline{45 \text{ minutos}}.$$

El tiempo que debe caminar antes de lanzarse al mar es de 45 minutos.

El tiempo total del recorrido es el siguiente:

$$\overline{PB} = \sqrt{x^2 - 12x + 45} \Rightarrow \overline{PB} = \sqrt{\left(\frac{15}{4}\right)^2 - 12 \cdot \frac{15}{4} + 45} = \sqrt{\frac{225}{16}} = \frac{15}{4} \text{ Km} = \overline{PB}.$$

$$T = \frac{x}{5} + \frac{\overline{PB}}{3} = \frac{15}{5 \cdot 4} + \frac{15}{3 \cdot 4} = \frac{3}{4} + \frac{5}{4} = \frac{8}{4} = \underline{\underline{2 \text{ horas} = T}}$$

4°-2) La estatura de una población se distribuye normalmente con media 1'70 metros y desviación típica 0'1 metros.

a) Se selecciona una persona al azar. Explicar razonadamente cómo se obtiene la probabilidad de que su estatura sea menor que 1'72 metros y calcular dicha probabilidad.

b) Se seleccionan a azar tres personas. Obtener razonadamente la probabilidad de que sólo una de ellas mida más de 1'72 metros.

a)

Para resolver este apartado es necesario utilizar las tablas de la distribución normal, para lo cual se necesita tipificar la variable x mediante la fórmula: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$.

En el caso que nos ocupa: $X = 1'72$; $\mu = 1'70$ y $\sigma = 0'1$, con lo cual resulta:

$$Z = \frac{1'72 - 1'70}{0'1} = \frac{0'02}{0'1} = 0'2.$$

La probabilidad de que la estatura de una persona elegida al azar sea menor que 1'72 es, según la tabla:

$$\underline{\underline{p(X \leq 1'72) = p(Z \leq 0'2) = 0'5793 = 57'93 \%}}$$

b)

Este apartado lo podemos considerar como una distribución binomial cuyos parámetros son los siguientes: $n = 3$; $p = 0'4207$; $q = 1 - p = 0'5793$, siendo n el número de personas elegidas; p la probabilidad de que la persona elegida mida más de 1'72 y q la probabilidad de que la persona elegida mida menos de 1'72.

$$p(X = 1) = \binom{3}{1} \cdot 0'4207^1 \cdot 0'5793^2 = 3 \cdot 0'4207 \cdot 0'3356 = \underline{\underline{0'4235 = 42'35 \% = p}}$$