RESERVA 2
OPCIÓN A

1. a) Conteste razonadamente a las siguientes preguntas: **i)** Una partícula se desplaza bajo la acción de una fuerza. ¿Puede asegurarse que esta fuerza realiza trabajo? **ii)** Una partícula, inicialmente en reposo, se desplaza bajo la acción de una fuerza conservativa. ¿Aumenta o disminuye su energía potencial? ¿Y la energía cinética?

a) i) la expresión general del trabajo asociado a una fuerza es:

$$W_{1 \rightarrow 2}^{\vec{F}} = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_1^2 |\vec{F}| \cdot \cos \alpha \cdot dr$$

y si la fuerza es constante:

$$W_{1 \rightarrow 2}^{\vec{F}} = F \cos \alpha \int_1^2 dr = F \cdot \Delta r \cdot \cos \alpha$$

desplazamiento

si $\alpha = 90^\circ$ o $\alpha = 270^\circ$, el trabajo es nulo (F y Δr son perpendiculares). es lo que sucede, por ejemplo, con la tensión en una cuerda o las fuerzas gravitatorias:

ii) Según el Teorema de la energía mecánica:

El trabajo total de todas las fuerzas no conservativas que actúan sobre una partícula se invierte en variar su energía mecánica.

$$W_{A \rightarrow B}^{F_{NC}} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F}_{NC} \cdot d\vec{r} = E_{MB} - E_{MA} = \Delta E_M$$

⇒ Entonces, en ausencia de fuerzas no conservativas $\vec{F}_{nc} = 0$ y $W_{A \rightarrow B}^{F_{nc}} = 0$, conservándose la energía mecánica (manteniéndose constante):

como dice el enunciado

$$\begin{aligned} \Delta E_M &= 0 \\ E_{MB} - E_{MA} &= 0 \\ E_{MB} &= E_{MA} \end{aligned}$$

Según el Teorema de la energía cinética o fuerzas vivas:

El trabajo total de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula se invierte en variar su energía cinética.

$$W_{A \rightarrow B}^{FR} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F}_R \cdot d\vec{r} = \Delta E_C = E_{CB} - E_{CA}$$

Como estaba en reposo ($E_{CA} = 0$) y empieza a moverse ($E_{CB} > 0$) el trabajo de las fuerzas vivas o total será positivo:

$$W_{A \rightarrow B}^{FR} = E_{CB} - E_{CA} = E_{CB} > 0 \rightarrow \text{La } E_C \text{ ha aumentado}$$

Según el Teorema de la energía potencial o de las fuerzas conservativas:

El trabajo total de todas las fuerzas conservativas que actúan sobre una partícula se invierte en variar su energía potencial.

$$W_{A \rightarrow B}^{FC} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F}_C \cdot d\vec{r} = -(E_{PB} - E_{PA}) = -\Delta E_P$$

Como la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es conservativa:

$$W_{A \rightarrow B}^{FR} = W_{A \rightarrow B}^{FC} + W_{A \rightarrow B}^{FC}$$

Si este trabajo es positivo, este también lo será: $W_{A \rightarrow B}^{FC} > 0$

$$E_{PA} - E_{PB} > 0$$

$$E_{PA} > E_{PB}$$

La E_P disminuye

* Intentad meter siempre los 3 teoremas *

b) Un objeto de 3kg, inicialmente en reposo, asciende por un plano inclinado de 30° respecto a la horizontal por la acción de una fuerza paralela al plano de 200N. El coeficiente de rozamiento entre el objeto y el plano es de 0,2. Calcule: **i)** El trabajo que realiza la fuerza cuando recorre 5m a lo largo del plano inclinado. **ii)** La velocidad que alcanza al final del trayecto usando consideraciones energéticas. $g = 9,8 \text{ m s}^{-1}$

b) Ascende.
i) Diagrama de fuerzas:

$m = 3 \text{ kg}$
 $F = 200 \text{ N}$
 $\mu = 0.2$

$$W_{1 \rightarrow 2}^F = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cdot \Delta r \cdot \cos 0^\circ = 200 \cdot 5 \cdot 1 = 1000 \text{ (J)}$$

ii) Altura h_2 : $\sin 30^\circ = \frac{h_2}{|\Delta \vec{r}|}$

$$h_2 = |\Delta \vec{r}| \cdot \sin 30^\circ = 5 \cdot \sin 30^\circ = 2.5 \text{ (m)}$$

Fuerza peso: $p = m \cdot g = 3 \cdot 9.8 = 29.4 \text{ (N)}$
 $p_x = p \cdot \sin \alpha = 29.4 \cdot \sin 30^\circ = 14.7 \text{ (N)}$
 $p_y = p \cdot \cos \alpha = 29.4 \cdot \cos 30^\circ = 25.46 \text{ (N)}$
 $\vec{p} = -14.7 \hat{i} - 25.46 \hat{j} \text{ (N)}$
yo si te lo voy a pedir, ojo

Fuerza normal: 2ª ley de Newton (Eje Y): $\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$
 No se mueve en el eje Y: $a = 0$ (Eje Y)
 $N - p_y = 0$
 $N = p_y = 25.46 \text{ (N)}$
 $\vec{N} = 25.46 \hat{j} \text{ (N)}$

Fuerza de rozamiento: $F_{roz} = \mu \cdot N = 0.2 \cdot 25.46 = 5.092 \text{ (N)}$
 $\vec{F}_{roz} = -5.092 \hat{i} \text{ (N)}$

Teorema de la energía mecánicas:

$$W_{1 \rightarrow 2}^{Fnc} = \Delta E_m = E_{m2} - E_{m1}$$

¡OJO! tenemos dos fuerzas no conservativas!

$$W_{1 \rightarrow 2}^{F_{roz}} + W_{1 \rightarrow 2}^F = E_{m2} - E_{m1}$$

$$\vec{F}_{roz} \cdot |\Delta \vec{r}| \cdot \frac{\cos 180^\circ}{-1} + \overset{0}{W_{1 \rightarrow 2}^F} = (E_{c2} + E_{p2}) - (E_{c1} + E_{p1})$$

La velocidad en el punto 1 es cero

La altura en el punto 1 es cero

$$- \vec{F}_{roz} \cdot |\Delta \vec{r}| + 1000 = \frac{1}{2} m v_2^2 + m \cdot g \cdot h_2$$

Despejo v_2 :

$$\begin{aligned} v_2^2 &= \frac{-\vec{F}_{roz} \cdot \Delta r + 1000 - mgh_2}{\frac{1}{2} m} = \\ &= \frac{-5692 \cdot 5 + 1000 - 3 \cdot 9,8 \cdot 2,5}{\frac{1}{2} \cdot 3} = 600,69 \end{aligned}$$

$$\rightarrow v_2 = \sqrt{600,69} = 24,51 \text{ (m/s)}$$

RESERVA 2
OPCIÓN A

2. a) **i)** Escriba la expresión matemática de la fuerza magnética sobre una carga puntual, indicando el significado de las magnitudes que aparecen en la ecuación. **ii)** Discuta, razonando sus respuestas, bajo qué condiciones el módulo de la fuerza magnética es máximo y cuándo se anula.

a) **i)** Fuerza de Lorentz:

Fuerza que ejerce el campo magnético sobre la carga 'q' (en newtons, N)

$$\vec{F}_m = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$

valor de la carga de la partícula (en culombios, C)

valor del campo magnético (en teslas, T)

valor de la velocidad de la partícula (en m/s)

ii) Módulo de la fuerza magnética:

$$F_m = |q| \cdot v \cdot B \cdot \text{sen}(\widehat{\vec{v}, \vec{B}})$$

• F_m será máxima cuando $\text{sen}(\widehat{\vec{v}, \vec{B}}) = +1$, lo cual ocurre para un ángulo de 90° : $\vec{v}$ y $\vec{B}$ deben ser perpendiculares.

• F_m se anula si la carga está en reposo ($v=0$) o cuando $\text{sen}(\widehat{\vec{v}, \vec{B}}) = 0$, lo cual ocurre para un ángulo de 0° o 180° : $\vec{v}$ y $\vec{B}$ deben ser paralelos.

- b)** Dos conductores rectilíneos, paralelos y muy largos separados 0,2m transportan corrientes de 10 y 4A, respectivamente, en sentidos opuestos. **i)** Dibuje en un esquema el campo magnético producido por cada uno de los conductores en un punto del plano definido por ellos y situado a 0,1 m a la derecha del segundo y calcule la intensidad del campo total. **ii)** Determine la fuerza por unidad de longitud sobre uno de los conductores, indicando si es atractiva o repulsiva.

b) i)

Principio de superposición: $\vec{B}_p = \vec{B}_{1p} + \vec{B}_{2p}$

módulos:

$$B_{1p} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d_1} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 0.3} = 6.67 \cdot 10^{-6} \text{ (T)}$$

$$B_{2p} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 4}{2\pi \cdot 0.1} = 8 \cdot 10^{-6} \text{ (T)}$$

CARÁCTER VECTORIAL:

$$\vec{B}_{1p} = -6.67 \cdot 10^{-6} \hat{u}$$

$$\vec{B}_{2p} = 8 \cdot 10^{-6} \hat{u} \implies \vec{B}_p = \vec{B}_{1p} + \vec{B}_{2p} = 1.33 \cdot 10^{-6} \text{ (T)}$$

ii)

Fuerza por unidad de longitud:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10 \cdot 4}{2\pi \cdot 0.2} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ (N/m)}$$

RESERVA 2
OPCIÓN A

3. a) Construya, razonadamente, la imagen de un objeto situado entre f y $2f$ delante de una lente divergente. A partir de la imagen obtenida indique, razonadamente, las características de la misma: real o virtual, si está derecha o invertida y su tamaño.

- b) Situamos delante de una lente convergente un objeto que genera una imagen que se forma a 1m delante de la lente, siendo la misma de tamaño 0,5m. Si la distancia focal vale 2m, calcule: **i)** La distancia a la que se encuentra el objeto de la lente. **ii)** Tamaño del objeto indicando si está derecho o invertido con respecto de la imagen.

b)i)

Ley de Gauss para las lentes delgadas:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{-1} - \frac{1}{s} = \frac{1}{2}$$

$$-1 - \frac{1}{s} = 0,5$$

$$-1 - 0,5 = \frac{1}{s}$$

$$s = \frac{1}{-1,5} = -0,67 \text{ m}$$

i) Aumento lateral:

$$m_L = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}; \quad \frac{0,5}{y} = \frac{-1}{-0,67}$$

$y = 0,335 \text{ m}$ Objeto derecho respecto de la imagen

$$\leftarrow \overbrace{f = -2\text{m} \quad f' = 2\text{m}} \rightarrow$$

$$\leftarrow \overbrace{s' = -1\text{m}} \rightarrow$$

$$\leftarrow \overbrace{s = -0.67\text{m}} \rightarrow$$

RESERVA 2
OPCIÓN A

4. a) El ${}^{35}_{16}\text{S}$ se desintegra emitiendo radiación beta, y el ${}^{210}_{84}\text{Po}$ emitiendo radiación alfa. Explique cómo es cada uno de los procesos citados y determine las características del nucleido resultante en cada caso.

Ley de conservación del número de nucleones: $35 = A + 0$
 $A = 35$

Ley de conservación de la carga eléctrica: $16 = Z - 1$
 $Z = 17$

Quando en una transformación radiactiva se emite una partícula beta, se obtiene un núcleo cuyo número atómico es una unidad mayor y no varía su número másico.

Ley de conservación del número de nucleones: $210 = A + 4$
 $A = 206$

Ley de conservación de la carga eléctrica: $84 = Z + 2$
 $Z = 82$

Quando en una transformación radiactiva se emite una partícula alfa, se obtiene un núcleo cuyo número atómico es dos unidades menor y su número másico es cuatro unidades menor.

- b) El yodo-131 tiene un periodo de semidesintegración de 8,02 días y una masa atómica de 130,9061u. Calcule la constante de desintegración, la actividad inicial de una muestra de 1,88mg y el tiempo necesario para que su masa se reduzca a 0,47mg. $1u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{kg}$.

$$\text{b)} T_{1/2} = 8,02 \text{ días} \cdot \frac{24 \text{ h}}{1 \text{ día}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 692928 \text{ s}$$

$$m(\text{I-131}) = 130,9061 \text{ u}$$

$$\Rightarrow T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} ; \lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{\ln(2)}{692928} = 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

$$m_0 = 1,88 \cdot 10^{-3} \text{ g}$$

$$\hookrightarrow N_0 = 1,88 \cdot 10^{-3} \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{10^3 \text{ g}} \cdot \frac{1 \text{ u}}{1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}} \cdot \frac{1 \text{ at}}{130,9061 \text{ u}} =$$

$$= 8,65 \cdot 10^{18} \text{ at.}$$

$$\Rightarrow A_0 = \lambda \cdot N_0 = 10^{-6} \cdot 8,65 \cdot 10^{18} = 8,65 \cdot 10^{12} \text{ (Bq) } \frac{\text{desintegraciones}}{\text{s}}$$

$$m = 0,47 \cdot 10^{-3} \text{ g}$$

$$\hookrightarrow N = 0,47 \cdot 10^{-3} \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{10^3 \text{ g}} \cdot \frac{1 \text{ u}}{1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}} \cdot \frac{1 \text{ at}}{130,9061 \text{ u}} =$$

$$= 2,16 \cdot 10^{18} \text{ at.}$$

Ley de desintegración radiactiva: $N = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$

$$\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t} = \frac{1}{e^{\lambda t}} ; e^{\lambda t} = \frac{N_0}{N} ; \lambda t \cdot \ln(e) = \ln\left(\frac{N_0}{N}\right)$$

$$\Rightarrow t = \frac{\ln\left(\frac{N_0}{N}\right)}{\lambda} = \frac{\ln\left(\frac{8,65 \cdot 10^{18}}{2,16 \cdot 10^{18}}\right)}{10^{-6}} = 1387451,1 \text{ s}$$

RESERVA 2
OPCIÓN B

1. a) Considere dos satélites de masas iguales en órbitas circulares alrededor de la Tierra. Uno de ellos gira en una órbita de radio r y el otro en una órbita de radio $2r$. Conteste razonadamente a las siguientes preguntas. **i)** ¿Cuál de los dos se desplaza con mayor velocidad? **ii)** ¿Cuál de los dos tiene mayor energía potencial?

∞) $\left. \begin{array}{l} \text{Satélite 1} \\ R_0 = r \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Satélite 2} \\ R_0 = 2r \end{array} \leftarrow \text{Masas iguales}$

i) Velocidad orbital $\rightarrow F_g = F_c = m \cdot a_n$

$$G \frac{mM_T}{R_0^2} = m \frac{v^2}{R_0}$$

$$v = \sqrt{G \frac{M_T}{R_0}}$$

$$\left. \begin{array}{l} v_1 = \sqrt{G \frac{M_T}{r}} \\ v_2 = \sqrt{G \frac{M_T}{2r}} \end{array} \right\} \frac{v_1}{v_2} = \frac{\sqrt{G \frac{M_T}{r}}}{\sqrt{G \frac{M_T}{2r}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}}} = \sqrt{2}$$

$v_1 = \sqrt{2} \cdot v_2$ El satélite 1 se mueve a mayor velocidad

ii) Energía potencial $\rightarrow E_p = -G \frac{M_T m}{R_0}$

$$\left. \begin{array}{l} E_{p1} = -G \frac{M_T m}{r} \\ E_{p2} = -G \frac{M_T m}{2r} \end{array} \right\} \frac{E_{p1}}{E_{p2}} = \frac{-G \frac{mM_T}{r}}{-G \frac{mM_T}{2r}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$E_{p1} = 2E_{p2}$ El satélite 1 tiene mayor E_p en valor absoluto

- b)** Un satélite de 500kg se pone a orbital en torno a un planeta, a una distancia de 24000km de su centro y con un periodo de 31 horas terrestres.
i) Calcule la masa del planeta. **ii)** Si se traslada el satélite a una órbita de radio

10000km, calcule la variación de energía cinética entre ambas órbitas. $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{Nm}^2 \text{kg}^{-2}$

b) $m = 500 \text{kg}$ $R_0 = 24000 \text{km} = 24 \cdot 10^7 \text{m}$

$$T = 31 \text{h} \cdot \frac{3600 \text{s}}{1 \text{h}} = 111600 \text{s}$$

i) Deduzco la fórmula de la velocidad orbital y, sustituyo con la fórmula del periodo:

$$F_g = F_c = m \cdot a_u$$

$$G \frac{m \cdot M_p}{R_0^2} = m \cdot \frac{v^2}{R_0}$$

$$G \frac{M_p}{R_0} = v^2$$

$$v = \omega R_0 = \frac{2\pi}{T} R_0$$

$$G \frac{M_p}{R_0} = \left(\frac{2\pi}{T} R_0 \right)^2$$

$$M_p = \frac{\left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \cdot R_0^3}{G}$$

$$= \frac{\left(\frac{2\pi}{111600} \right)^2 \cdot (24 \cdot 10^7)^3}{6,67 \cdot 10^{-11}} = 6,57 \cdot 10^{23} \text{kg}$$

ii) Energía cinética en cada una de las órbitas:

$$E_{c1} = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m G \frac{M_p}{R_{01}}$$

$$= \frac{1}{2} 500 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{6,57 \cdot 10^{23}}{24 \cdot 10^7} = 456478125 \text{ (J)}$$

$$R_{02} = 10^4 \text{km} = 10^7 \text{m}$$

$$E_{c2} = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m G \frac{M_p}{R_{02}}$$

$$= \frac{1}{2} 500 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{6,57 \cdot 10^{23}}{10^7} = 1095547500 \text{ (J)}$$

$$\implies \Delta E_c = E_{c2} - E_{c1} = 639069375 \text{ (J)} = 6,4 \cdot 10^8 \text{ (J)}$$

RESERVA 2
OPCIÓN B

2. a) Una carga eléctrica puntual con valor Q se encuentra en el vacío. **i)** Escriba la expresión matemática del potencial eléctrico en un punto genérico situado a una distancia r de la carga e indique el significado de cada una de las magnitudes que aparecen en la expresión. **ii)** Si el potencial aumenta al alejarnos de la carga, indique razonadamente el signo de la misma.

∞) i)

La expresión matemática del potencial viene dada por:

$$V = k \frac{Q}{r}$$

y se define como: el trabajo que debe hacer el campo eléctrico cuando se traslada la unidad de carga positiva (1C) desde un punto A hasta el infinito. Se mide en voltios ($J/C = V$).

- k constante eléctrica que depende del medio en que se hallen las cargas. Se mide en $\frac{Nm^2}{C^2}$
- Q carga que produce el campo eléctrico. Se mide en culombios, C.
- r es la distancia desde la carga Q al punto P donde se va a medir el potencial. Se mide en metros.

ii) Si $Q > 0$ entonces $V = k \frac{Q}{r} > 0$, entonces, al aumentar la distancia, el potencial disminuiría. Esto no coincide con el enunciado.

Si $Q < 0$ entonces $V = k \frac{Q}{r} < 0$, entonces, al aumentar la distancia, el potencial aumentaría (se haría menos negativo). Se deduce pues que la carga Q es negativa.

- b)** Considere una carga puntual de $5 \cdot 10^{-6}C$ localizada en el vacío. Determine: **i)** El potencial eléctrico creado por la carga puntual a una distancia de 0,5m. **ii)** El trabajo necesario para transportar una carga puntual de $-2 \cdot 10^{-6}C$ desde el infinito hasta una distancia de 0,5m de la carga original, indicando razonadamente el significado del signo del trabajo obtenido. $K = 9 \cdot 10^9 Nm^2 kC^{-2}$

b) i) $q_1 = +5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$

$$V_{1P} = k \frac{q_1}{r_{1P}} =$$

$$= 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-6}}{0.5} = 9 \cdot 10^4 \text{ (V)}$$

ii) $W_{\infty \rightarrow P} = q_2 \cdot (V_{\infty} - V_P) = -q_2 \cdot V_P =$
 $= -(-2 \cdot 10^{-6}) \cdot 9 \cdot 10^4 = 0.18 \text{ (J)}$

$$W_{A \rightarrow B} > 0 \rightarrow E_{PA} > E_{PB}$$

La carga q disminuye su energía potencial eléctrica con la distancia.

La carga q se desplaza por acción de las fuerzas del campo eléctrico.

Esto ocurre cuando se acercan dos cargas de signo contrario o se alejan dos cargas del mismo signo.

Es un proceso espontáneo.

RESERVA 2
OPCIÓN B

3. a) Razone la veracidad o falsedad de las siguientes frases utilizando, si procede, algún ejemplo: **i)** El espectro electromagnético está formado solo por las ondas electromagnéticas que podemos percibir con nuestra vista. **ii)** Si al iluminar un objeto con luz blanca, lo vemos de color rojo, es debido a que el objeto absorbe las tonalidades rojas de luz.

a) i) **FALSA.** Llamamos **espectro electromagnético** a la secuencia de todas las ondas electromagnéticas conocidas (no solo las del rango visible al ojo humano), ordenadas según su longitud de onda o su frecuencia.

ii) **FALSA.** La luz blanca llega al objeto, el cual absorbe todas las longitudes de onda a excepción de la del haz rojo, que es el que refleja y el que llega a nuestra vista.

b) Un rayo de luz monocromático de frecuencia $6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ incide con un ángulo de 35° sobre la superficie de separación de dos medios con diferente índice de refracción. Sabiendo que la luz viaja por el primer medio a una velocidad de $2,4 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ y que la longitud de onda en el segundo medio es de $5 \cdot 10^{-7} \text{ m}$: **i)** Calcule el ángulo de refracción. **ii)** Determine el ángulo límite de incidencia a partir del cual se produciría la reflexión total. $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

b) $f = 6 \cdot 10^{14} \text{ (Hz)}$ $\theta_i = 35^\circ$ $v_{\text{prop}} = 2,4 \cdot 10^8 \text{ (m/s)}$ $\lambda_2 = 5 \cdot 10^{-7} \text{ (m)}$

i)
 $n_1?$
 $n_2?$
 $v_{\text{prop}} = 2,4 \cdot 10^8 \text{ (m/s)}$
 $\lambda_2 = 5 \cdot 10^{-7} \text{ (m)}$
 $n_2?$
 $v_{\text{prop}}?$

*** Principio de Huygens ***

Leyes de la reflexión y refracción:

- Los rayos incidente, normal, reflejado y refractado están en el mismo plano.
- El ángulo de incidencia y reflejado son iguales: $\theta_i = \theta_r = 35^\circ$

La frecuencia de la onda no varía al pasar de un medio a otro ya que únicamente depende de las características del foco emisor.

MEDIO 1

$$v_{p1}^1 = \lambda_1 \cdot f \rightarrow \lambda_1 = \frac{v_{p1}^1}{f} = \frac{2'4 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^{14}} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ (cm)}$$

$$n_1 = \frac{c}{v_{p1}^1} = \frac{3 \cdot 10^8}{2'4 \cdot 10^8} = 1'25$$

MEDIO 2

$$v_{p2}^2 = f \cdot \lambda_2 = 6 \cdot 10^{14} \cdot 5 \cdot 10^{-7} = 3 \cdot 10^8 \text{ (cm/s)}$$

El medio 2 es el aire

$$n_2 = \frac{c}{v_{p2}^2} = 1$$

Pasa de un medio más denso a otro menos denso: el rayo se aleja de la normal.

Ley de Snell: $n_1 \cdot \text{sen}(\theta_i) = n_2 \cdot \text{sen}(\theta_r)$

$$\theta_r = \text{arc sen} \left(\frac{n_1}{n_2} \text{sen}(\theta_i) \right) = \text{arc sen} \left(\frac{1'25}{1} \text{sen}(35^\circ) \right) = 45'8^\circ$$

ii)

La reflexión total se produce cuando todo el rayo se refleja y nada se refracta.

Para que el rayo refractado se aleje de la normal hasta convertirse en 90° el rayo debe pasar de un medio más denso a otro menos denso ($n_1 > n_2$). En este caso, la v_{p2} aumenta de un medio a otro.

El ángulo de incidencia límite se calcula con la Ley de Snell:

$$n_1 \cdot \text{sen} \theta_i = n_2 \cdot \text{sen} 90^\circ$$

$$\theta_i = \text{arc sen} \left(\frac{n_2}{n_1} \right) = \text{arc sen} \left(\frac{1}{1'25} \right) = 53'13^\circ$$

Para ángulos igual o mayores se produce reflexión total.

RESERVA 2 OPCIÓN B

4. a) Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: **i)** ¿Se podría determinar simultáneamente, con exactitud, la posición y la cantidad de movimiento de una partícula? **ii)** ¿Se tiene en cuenta el principio de incertidumbre en el estudio de los fenómenos ordinarios?

e) i)

En **1927 Werner Karl Heisenberg** enunció su **principio de indeterminación** o **principio de incertidumbre**, el cual nos proporciona unos límites para la información que podemos conocer de un objeto cuántico. Este principio tiene dos partes:

- **No es posible determinar simultáneamente el valor exacto de la posición x y del momento lineal p de un objeto cuántico.** Las medidas del objeto observable sufrirán desviación estándar Δx de posición y Δp de momento lineal, quedando el principio expresado como:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

- **No es posible determinar simultáneamente el valor medido de la energía E de un objeto cuántico y el intervalo de tiempo necesario para efectuar la medida.** Esto exige que se cumpla:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$$

Este principio se origina al intentar realizar medidas a nivel cuántico, donde el doble carácter corpuscular y ondulatorio de las partículas impide que conozcamos con precisión y a la vez su posición y momento lineal.

Esta incertidumbre en la medida no depende de la precisión de los aparatos de medida; es una característica intrínseca de la naturaleza.

ii) En los fenómenos ordinarios se trabaja en el mundo macroscópico. Como ya sucedía con la longitud de onda asociada a los objetos en movimiento, la indeterminación en objetos macroscópicos no tiene efectos apreciables.

El valor de la constante de Planck ($6,625 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$) hace que el error intrínseco sea del todo inapreciable.

b) Al iluminar un metal con una radiación de frecuencia $7,89 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ se produce una emisión de electrones que requiere aplicar una diferencia de potencial de 1,3V para frenarlos. Calcule razonadamente el trabajo de extracción del metal y justifique si al iluminarlo con una radiación de frecuencia $4 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ se producirá emisión de electrones. $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Con esta primera parte se justifica el apartado i)

Esto es awesome

$$b) f = 7'89 \cdot 10^{14} \text{ Hz} , \Delta V_p = 1,3 \text{ (V)}$$

Teorema de Conservación de la Energía Mecánica:

$$W_{\text{Fuc}} = \Delta E_m = E_{m2} - E_{m1}$$

Como sdo hay fuerzas conservativas (fuerzas elécticas) entonces $W_{\text{Fuc}} = 0$:

$$E_{m1} = E_{m2}$$

$$q \cdot \Delta V_p = E_{c2}$$

$$\Rightarrow E_{\text{electrón}} = 1'6 \cdot 10^{-19} \cdot 1,3 = 2,08 \cdot 10^{-19} \text{ (J)}$$

Ecuación fotoeléctrica de Einstein:

$$E_{\text{fotón-incidente}} = W_{\text{extracción-electrón}} + E_{\text{electrón-emisado}}$$

$$\Rightarrow W_{\text{ext}} = E_{\text{fotón}} - E_{\text{ce}} = h \cdot f - E_{\text{c}} =$$

$$= 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 7'89 \cdot 10^{14} - 2,08 \cdot 10^{-19} = 3,15 \cdot 10^{-19} \text{ (J)}$$

De ahí podemos calcular la frecuencia umbral:

$$W_{\text{ext}} = h \cdot f_u \longrightarrow f_u = \frac{W_{\text{ext}}}{h} = \frac{3'15 \cdot 10^{-19}}{663 \cdot 10^{-34}} = 4,75 \cdot 10^{14} \text{ (Hz)}$$

Como $f = 4 \cdot 10^{14} \text{ Hz} < f_u$ no se producirá efecto fotoeléctrico.