

1º) En un experimento aleatorio A y B son dos sucesos independientes tales que $p(\bar{A}) = 0,4$ y $p(B) = 0,7$

Calcúlese:

a) $p(A \cup B)$

b) $p(A - B)$

Resolución

$$p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - 0,4 = 0,6 ; p(A \cap B) \stackrel{\text{indep}}{=} p(A) \cdot p(B) = 0,6 \cdot 0,7 = 0,42$$

a) $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = 0,6 + 0,7 - 0,42 = 0,88$

b) $p(A - B) = p(A) - p(A \cap B) = 0,6 - 0,42 = 0,18$

2º) En una población se sabe que el 80% de los jóvenes tiene ordenador portátil, el 60% tiene teléfono móvil y el 10% no tiene portátil ni móvil. Si un joven de esa población tiene teléfono móvil, calcula la probabilidad de que dicho joven tenga también ordenador portátil.

Resolución

$P = \text{"El joven tiene ordenador portátil"} ;$

$M = \text{"El joven tiene teléfono móvil"} ;$

$$p(P) = 0,8 ; p(M) = 0,6 ; p(\bar{P} \cap \bar{M}) = 0,1$$

$$p(\bar{P} \cap \bar{M}) = 0,1 \Rightarrow p(\overline{P \cup M}) = 0,1 \Rightarrow p(P \cup M) = 1 - 0,1 = 0,9$$

$$p(P \cup M) = p(P) + p(M) - p(P \cap M) \Leftrightarrow 0,9 = 0,8 + 0,6 - p(P \cap M) \Leftrightarrow p(P \cap M) = 0,5$$

$$p(P|M) = \frac{p(P \cap M)}{p(M)} = \frac{0,5}{0,6} = \frac{5}{6} \cong 0,8333$$

3º) Los operarios A , B y C producen, respectivamente, el 50%, el 30% y el 20% de las resistencias que se producen en un laboratorio de electrónica. Resultan defectuosas el 6% de las resistencias producidas por A , el 5% de las producidas por B y el 3% de las producidas por C . Se selecciona al azar una resistencia:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuosa?

b) Si es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producida por el operario A ?

Resolución

Consideramos los sucesos siguientes:

$A = \text{"La resistencia ha sido producida por el operario A"}$

$B = \text{"La resistencia ha sido producida por el operario B"}$

$C = \text{"La resistencia ha sido producida por el operario C"}$

$D = \text{"La resistencia es defectuosa"}$

Del enunciado tenemos que

$$p(A) = 0,5 ; p(B) = 0,3 ; p(C) = 0,2 ; p(D|A) = 0,06 ; p(D|B) = 0,05 ; p(D|C) = 0,03$$

a) $p(\bar{D}) \stackrel{P.Total}{=} p(A) \cdot p(\bar{D}|A) + p(B) \cdot p(\bar{D}|B) + p(C) \cdot p(\bar{D}|C) =$

$$0,5 \cdot (1 - 0,06) + 0,3 \cdot (1 - 0,05) + 0,2 \cdot (1 - 0,03) = 0,47 + 0,285 + 0,194 = 0,949$$

$$\textcircled{2}) p(A|D) \stackrel{T.Bayes}{=} \frac{p(A) \cdot p(D|A)}{p(D)} = \frac{0,5 \cdot 0,06}{1 - 0,949} = \frac{0,03}{0,051} = \frac{30}{51} = \frac{10}{17} \cong 0,5882$$

4º) Las notas que se han obtenido por 1500 opositores, para optar a 330 plazas de administrativos en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, han seguido una distribución normal de media 4,05 puntos y desviación típica 2,5. Determina razonadamente:

a) ¿cuántos opositores han superado el 5?

b) La nota de corte.

c) El porcentaje de opositores que obtienen menos de un 4.


Resolución

Definimos la variable X = "Notas obtenidas"; $X \rightarrow N(4,05 ; 2,5)$

$$\textcircled{2}) p(X > 5) = p\left(Z > \frac{5 - 4,05}{2,5}\right) = p(Z > 0,38) = 1 - p(Z \leq 0,38) = 1 - 0,6480 = 0,352$$

El número de opositores que han superado el 5 es $1500 \cdot 0,352 = 528$

b) Las 330 plazas son para las notas más altas y como $\frac{330}{1500} = 0,22$ se trata de hallar el valor $4,05 + k$ tal que por encima de él están el 22% de las calificaciones o, lo que es lo mismo,



$$p(X \leq 4,05 + k) = 0,78$$

$$p(X \leq 4,05 + k) = 0,78 \Leftrightarrow p\left(Z \leq \frac{k}{2,5}\right) = 0,78 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{k}{2,5} = 0,775 \Leftrightarrow k = 1,9375$$

La nota de corte es $4,05 + 1,9375 = 5,9875$

$$c) p(X < 4) = p\left(Z < \frac{4 - 4,05}{2,5}\right) = p(Z < -0,02) = p(X > 0,02) = 1 - p(Z \leq 0,02)$$

$$= 1 - 0,5080 = 0,492$$

El porcentaje de opositores que obtienen menos de un 4 es el 49,2%

5º) La probabilidad de que un test rápido para detectar COVID-19 dé "negativo" en humanos es $p = 0,7$.

a) Si hacemos test rápidos a 5 personas elegidas aleatoriamente, calcula la probabilidad de que al menos 4 den negativo.

b) Si realizamos una campaña con 2100 test rápidos para detectar COVID-19, utilizando la aproximación de la binomial por la normal, calcula la probabilidad de que den negativo por lo menos 1450 test.

Resolución

Consideramos el suceso A = "El test da negativo" ; $p(A) = 0,7 = p$ y esta probabilidad es la misma cada vez que volvemos a realizar el test.

Sea la variable aleatoria discreta X = "Número de test negativos"

a) Se trata de una binomial $X \hookrightarrow B(5, 0'7)$

$$P(X \geq 4) = p(X = 4) + p(X = 5) = \binom{5}{4} 0,7^4 \cdot 0,3^1 + \binom{5}{5} 0,7^5 = 5 \cdot 0,7^4 \cdot 0,3 + 0,7^5 = 0,52822$$

b) Ahora el número de test es $n = 2100$

Se trata de una binomial $X \hookrightarrow B(2100, 0'7)$

Como $np(1 - p) = 2100 \cdot 0,7 \cdot 0,3 = 441 > 10$, la binomial se puede aproximar por una normal de media el producto $2100 \cdot 0,7 = 1470$ y desviación típica $\sqrt{2100 \cdot 0,7 \cdot 0,3} = \sqrt{441} = 21$

$$X \hookrightarrow (2100, 0,7) \hookrightarrow N(1470, 21)$$

$$p(X \geq 1450) \stackrel{\text{Tipificamos}}{=} p\left(Z \geq \frac{1449,5 - 1470}{21}\right) = p(Z \geq -0,98) = p(Z \leq 0,98) = 0,8365$$
