

1. Simplifica las siguientes expresiones con radicales, extrayendo factores del radical en los casos que sea posible:

$$\begin{aligned} \text{a) } \sqrt[3]{24} ; \text{ b) } \sqrt[6]{27} ; \text{ c) } \sqrt[3]{-108} ; \text{ d) } \sqrt[12]{64y^3} ; \text{ e) } \sqrt[4]{\frac{81}{64}} ; \text{ f) } 3\sqrt{8a^3} ; \text{ g) } \sqrt{x^4y^6} ; \text{ h) } \sqrt{\frac{125a^2}{16b}} ; \\ \text{i) } \sqrt{\frac{16}{a^3}} ; \text{ j) } \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{9}} ; \text{ k) } \sqrt{\frac{a}{9} + \frac{a}{16}} ; \text{ l) } \sqrt[4]{1 + \frac{9}{16}} ; \text{ m) } \frac{x^2y^3}{2} \sqrt{\frac{8x}{x^7y^4}} \end{aligned}$$

2. Reduce a índice común y ordena de menor a mayor:

$$\text{a) } \sqrt[4]{4}, \sqrt[3]{3}, \sqrt{2} ; \text{ b) } \sqrt{6}, \sqrt[3]{4} ; \text{ c) } \sqrt[4]{6}, \sqrt[5]{10} ; \text{ d) } \sqrt[4]{72}, \sqrt[3]{9}, \sqrt[6]{100}$$

3. Efectúa y simplifica. Extrae factores, si es posible:

$$\begin{aligned} \text{a) } \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{2} ; \text{ b) } \frac{\sqrt[8]{625}}{\sqrt[4]{25}} ; \text{ c) } 4\sqrt{27} \cdot 5\sqrt{6} ; \text{ d) } 2\sqrt{\frac{4}{3}} \cdot \sqrt{\frac{27}{8}} ; \text{ e) } \sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{1}{8}} ; \text{ f) } (\sqrt[6]{32})^3 ; \text{ g) } \frac{\sqrt[4]{a^3} \cdot \sqrt[5]{a^4}}{\sqrt{a}} ; \\ \text{h) } \sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{a}} \cdot \sqrt{a} ; \text{ i) } \left(\frac{\sqrt[6]{32}}{\sqrt{8}} \right)^3 ; \text{ j) } \sqrt[4]{3\sqrt{4}} ; \text{ k) } \sqrt[3]{2\sqrt[4]{8}} ; \text{ l) } \frac{\sqrt[3]{2\sqrt{3}}}{\sqrt[3]{4}} ; \text{ m) } \sqrt[3]{\sqrt{16}} ; \text{ n) } \sqrt{2\sqrt{2}\sqrt{2}} ; \\ \text{ñ) } \sqrt{3\sqrt[3]{2}\sqrt[5]{3}} ; \text{ o) } \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4}}{\sqrt[5]{8}} ; \text{ p) } \frac{\sqrt[3]{12} \cdot \sqrt[4]{18}}{\sqrt{24}} ; \text{ q) } \frac{3\sqrt[3]{500ab^3}}{\sqrt[3]{4a}} ; \text{ r) } \sqrt[3]{5\sqrt[3]{\frac{1}{25}}} ; \text{ s) } \sqrt[3]{\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{2}{3}}} ; \text{ t) } \sqrt[3]{ab^2} \sqrt[4]{\frac{1}{ab}} \end{aligned}$$

4. Simplifica al máximo las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} \text{a) } 5\sqrt{125} + 6\sqrt{45} - 7\sqrt{20} + \frac{3}{2}\sqrt{80} ; \text{ b) } \sqrt[3]{16} + 2\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{54} - \frac{21}{5}\sqrt[3]{250} ; \text{ c) } \sqrt{125} + \sqrt{54} - \sqrt{45} - \sqrt{24} ; \\ \text{d) } 3\sqrt[3]{16} - 2\sqrt[3]{250} + 5\sqrt[3]{54} - 4\sqrt[3]{2} ; \text{ e) } \sqrt{\frac{2}{5}} - 4\sqrt{\frac{18}{125}} + \frac{1}{3}\sqrt{\frac{8}{45}} ; \text{ f) } \frac{1}{3}\sqrt{5} - \frac{1}{6}\sqrt{20} + \frac{1}{8}\sqrt{45} ; \\ \text{g) } \frac{1}{2}\sqrt{28} - \frac{2}{5}\sqrt{63} + \frac{1}{8}\sqrt{175} ; \text{ h) } 7\sqrt[3]{81a} - \sqrt[3]{3a^4} + \frac{\sqrt[3]{3a}}{5} ; \text{ i) } \sqrt[3]{3x^3} + \sqrt[3]{24y^3} + \sqrt[3]{81z^6} ; \text{ j) } \sqrt{\frac{a^4b}{c^5}} - \sqrt{\frac{4a^2b}{c^3}} + \sqrt{\frac{b}{c}} \end{aligned}$$

5. Racionaliza los denominadores y simplifica:

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{18}} ; \text{ b) } \frac{2}{\sqrt[3]{2}} ; \text{ c) } \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} ; \text{ d) } \frac{3}{3+\sqrt{3}} ; \text{ e) } \frac{\sqrt{72}+3\sqrt{32}-\sqrt{8}}{\sqrt{8}} ; \text{ f) } \frac{11}{2\sqrt{5}+3} ; \text{ g) } \frac{4\sqrt{15}-2\sqrt{21}}{2\sqrt{5}-\sqrt{7}} ; \\ \text{h) } \frac{2\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{18}} ; \text{ i) } \frac{2\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{12}} ; \text{ j) } \frac{1}{2(\sqrt{3}-\sqrt{5})} ; \text{ k) } \frac{3}{\sqrt{5}-2} ; \text{ l) } \frac{3\sqrt{6}+2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}+2} ; \text{ m) } \frac{2\sqrt{8x}+\sqrt{128x}-\sqrt{72x}}{2\sqrt{2x}} \end{aligned}$$

6. Efectúa las siguientes operaciones y simplifica:

$$\begin{aligned} \text{a) } (\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+2) ; \text{ b) } (\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-\sqrt{3}) ; \text{ c) } \left(\sqrt{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 ; \text{ d) } (2-\sqrt{5})(3+2\sqrt{5}) ; \text{ e) } (1-\sqrt{2})^3 ; \\ \text{f) } (1-\sqrt{3})\left(\frac{1+\sqrt{3}}{-2} \right) ; \text{ g) } (\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{6}-1) ; \text{ h) } (\sqrt{5}-\sqrt{6})(\sqrt{5}+\sqrt{6}) ; \text{ i) } (\sqrt{6}+\sqrt{5})2\sqrt{2} ; \\ \text{j) } (2\sqrt{5}-3\sqrt{2})^2 ; \text{ k) } (\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)\sqrt{3} ; \text{ l) } (\sqrt{3}+\sqrt{2})^2 - (\sqrt{3}-\sqrt{2})^2 ; \text{ m) } 5\sqrt{a} + \sqrt{16a} - 3\sqrt{a - \frac{16a}{25}} \end{aligned}$$

7. Si $\sqrt{2} \cong 1,414$, ¿puedes calcular el valor aproximado de $\frac{6}{\sqrt{2}}$ sin calculadora?


8. Racionaliza denominadores, efectúa las operaciones y simplifica:

a) $\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1}$; b) $\frac{3}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} - \frac{2}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$; c) $\frac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{\sqrt{7}+\sqrt{5}} - \frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$; d) $\frac{(\sqrt{2}-1)(1-\sqrt{2})}{\sqrt{2}+2}$;

e) $\frac{7}{3-\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \frac{1}{2-\sqrt{3}}$; f) $\frac{5}{\sqrt{6}} + \frac{2}{\sqrt{6}+3\sqrt{2}} - \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$; g) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}}}$; h) $\frac{\sqrt{1-x} + \frac{1}{\sqrt{1+x}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}$


9. Comprueba que $\sqrt{6+\sqrt{27}} \cdot \sqrt{6-\sqrt{27}}$ es un número entero.

10. Los puntos A y B dividen a la diagonal del cuadrado en tres partes iguales.





Si el área del cuadrado es de 36 cm^2 , ¿cuánto medirá el lado del rombo? Da el **valor exacto**.

11. En un cuadrado de 10 cm de lado, recortamos en cada esquina un triángulo rectángulo isósceles de forma que obtenemos un octógono regular.



Halla la **medida exacta** del lado del octógono y calcula su área.

12. Supongamos que tenemos un cubo de arista 1 , tal y como se indica en la figura de la izquierda.



La diagonal de una cara, $k = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, y la diagonal del cubo $d = \sqrt{1^2 + \sqrt{2}^2} = \sqrt{3}$, son números irracionales. Averigua si son racionales o irracionales las distancias m y n señaladas en la figura de la derecha.

Soluciones

1. Simplifica las siguientes expresiones con radicales, extrayendo factores del radical en los casos que sea posible:

a) $2\sqrt[3]{3}$; b) $\sqrt{3}$; c) $-3\sqrt[3]{4}$; d) $\sqrt[4]{4y} = \sqrt{2}\sqrt[4]{y}$; e) $\frac{3}{\sqrt{8}}$; f) $6a\sqrt{2a}$;

g) x^2y^3 ; h) $\frac{5a}{4}\sqrt{\frac{5}{b}}$; i) $\frac{4}{a\sqrt{a}}$; j) $\frac{\sqrt{13}}{6}$; k) $\frac{5\sqrt{a}}{12}$; l) $\frac{\sqrt{5}}{2}$; m) $\frac{\sqrt{2}y}{x}$

2. Reduce a índice común y ordena de menor a mayor:

a) $\sqrt[4]{4} = \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$; b) $\sqrt[3]{4} < \sqrt{6}$; c) $\sqrt[4]{6} < \sqrt[5]{10}$; d) $\sqrt[3]{9} < \sqrt[6]{100} < \sqrt[4]{72}$

3. Efectúa y simplifica. Extrae factores, si es posible:

a) $\sqrt[6]{32}$; b) 1 ; c) $180\sqrt{2}$; d) $\frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$; e) $\frac{1}{2}$; f) $4\sqrt{2}$; g) $\sqrt[20]{a^{11}}$; h) $\sqrt[6]{a^5}$; i) $\frac{1}{4}$; j) $\sqrt[6]{2}$;

k) $\sqrt[12]{128}$; l) $\sqrt[6]{3}$; m) $\sqrt[3]{4}$; n) $\sqrt[8]{128}$; ñ) $\sqrt[30]{2^5 \cdot 3^{16}} = \sqrt{2} \cdot \sqrt[15]{3^8}$; o) $\sqrt[30]{2^{17}}$; p) $\sqrt[12]{\frac{3^4}{2^7}} = \sqrt[12]{\frac{81}{128}}$;

q) $15b$; r) $\sqrt[9]{5}$; s) $\sqrt[9]{\frac{9}{4}}$; t) $\sqrt[12]{a^3b^7}$

4. Simplifica al máximo las siguientes expresiones:

a) $35\sqrt{5}$; b) $-20\sqrt[3]{2}$; c) $2\sqrt{5} + \sqrt{6}$; d) $7\sqrt[3]{2}$; e) $-\frac{53}{45}\sqrt{\frac{2}{5}} = -\frac{53\sqrt{10}}{225}$;

f) $\frac{3\sqrt{5}}{8}$; g) $\frac{17\sqrt{7}}{40}$; h) $\frac{106-5a}{5}\sqrt[3]{3a}$; i) $(x+2y+3z^2)\sqrt[3]{3}$; j) $\frac{a^2-2ac+c^2}{c^2}\sqrt{\frac{b}{c}}$

5. Racionaliza los denominadores y simplifica:

a) $\frac{\sqrt{6}}{3}$; b) $\sqrt[3]{4}$; c) $\frac{2-\sqrt{2}}{2} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$; d) $\frac{3-\sqrt{3}}{2}$; e) 8 ; f) $2\sqrt{5}-3$; g) $2\sqrt{3}$;

h) $\frac{\sqrt{6}-1}{3}$; i) $\frac{6+\sqrt{6}}{6} = 1 + \frac{\sqrt{6}}{6}$; j) $\frac{-\sqrt{5}-\sqrt{3}}{4}$; k) $3\sqrt{5}+6$; l) $\sqrt{2}$; m) 3

6. Efectúa las siguientes operaciones y simplifica:

a) $5+3\sqrt{3}$; b) -1 ; c) $\frac{11}{4} + \sqrt{6}$; d) $-4 + \sqrt{5}$; e) $7-5\sqrt{2}$; f) 1 ; g) $\sqrt{3}+2\sqrt{2}$;

h) -1 ; i) $4\sqrt{3}+2\sqrt{10}$; j) $38-12\sqrt{10}$; k) $\sqrt{3}$; l) $4\sqrt{6}$; m) $\frac{36\sqrt{a}}{5}$

7. 4,242

8. Racionaliza denominadores, efectúa las operaciones y simplifica:

a) 2 ; b) $\sqrt{3}+5\sqrt{2}$; c) $-2\sqrt{35}$; d) $\frac{7\sqrt{2}}{2}-5$; e) 5 ; f) $\frac{3\sqrt{2}-4\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{2\sqrt{6}}{3}$; g) $\frac{3}{4}$; h) $\sqrt{1-x}$

9. El número entero es 3.

10. $2\sqrt{5}$ cm.

11. Lado del octógono: $10\sqrt{2}-10 = 10(\sqrt{2}-1)$ cm. Área del octógono $200\sqrt{2}-200 = 200(\sqrt{2}-1)$ cm².

12. m es irracional y su valor es $m = \frac{\sqrt{5}}{2}$. n es racional y su valor es $n = \frac{3}{2}$.