

**Problema 1** Dada la función

$$f(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$$

Se pide:

1. Calcular sus asíntotas.
2. Calcular sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, calculando sus extremos relativos.
3. Representación gráfica.
4. Calcular las rectas tangente y normal a  $f$  en el punto de abscisa  $x = 2$ .

**Solución:**

a) Asíntotas:

- **Verticales:**  $x = 1$  ya que  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{x^2 - 1} = \pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x}{x^2 - 1} = \left[ \frac{2}{0^-} \right] = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x}{x^2 - 1} = \left[ \frac{2}{0^+} \right] = +\infty$$

$$x = -1 \text{ ya que } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x}{x^2 - 1} = \pm\infty$$


$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2x}{x^2 - 1} = \left[ \frac{-2}{0^+} \right] = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x}{x^2 - 1} = \left[ \frac{-2}{0^-} \right] = +\infty$$

- **Horizontales:**  $y = 0$  ya que  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2 - 1} = 0$
- **Oblicuas:** No hay por haber horizontales

b)  $f'(x) = -\frac{2(x^2 + 1)}{(x^2 - 1)^2} \neq 0 \implies$  No hay extremos y la función es creciente en  $R - \{\pm 1\}$ .

c) Representación:




- d) Calcular las rectas tangente y normal a la gráfica de  $f$  en el punto de abscisa  $x = 2$ :

Como  $f(2) = 4/3$  las rectas pasan por el punto  $(2, 4/3)$ .

Como  $m = f'(2) = -10/9$  tenemos que

$$\text{Recta Tangente : } y - \frac{4}{3} = -\frac{10}{9}(x - 2)$$

$$\text{Recta Normal : } y - \frac{4}{3} = \frac{9}{10}(x - 2)$$



**Problema 2** Calcular las siguientes integrales

1.  $\int (3x^5 - 5x^2 - 3) dx = \frac{x^6}{2} - \frac{5x^3}{3} - 3x + C$
2.  $\int \frac{2x^4 - x^2 + 3}{x} dx = \frac{x^4}{2} - \frac{x^2}{2} + 3 \ln |x| + C$
3.  $\int \left( \frac{6x^4 - 3x^2 + 2}{x^3} - 5e^x \right) dx = 3x^2 - 3 \ln x - x^{-2} - 5e^x + C$
4.  $\int \left( \frac{4x^2 + 7x - 3}{x^2} + 2e^x \right) dx = 4x + 7 \ln |x| - \frac{3}{x} + 2e^x + C$
5.  $\int \left( \frac{3x^6 + \sqrt[7]{x^3} - 2x^2}{x^3} + 7e^x \right) dx = \frac{3x^4}{4} - \frac{7x^{-11/7}}{11} - 2 \ln |x| + 7e^x + C$