Vectores en el espacio

Problemas Resueltos

Vectores

1. Para $\vec{a} = (1, -2, 3)$ y $\vec{b} = (3, -1, 4)$, halla:

a) $\vec{a} + \vec{b}$ b) $2\vec{a} - \vec{b}$ c) $-\vec{a} + 3\vec{b}$ d) $\vec{c} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$

Solución:

a) $\vec{a} + \vec{b} = (1, -2, 3) + (3, -1, 4) = (4, -3, 7)$.

b) $2\vec{a} - \vec{b} = 2 \cdot (1, -2, 3) - (3, -1, 4) = (2 - 3, -4 + 1, 6 - 4) = (-1, -3, 2)$.

c) $-\vec{a} + 3\vec{b} = -(1, -2, 3) + 3 \cdot (3, -1, 4) = (-1 + 9, 2 - 3, -3 + 12) = (8, -1, 9)$.

d) $\vec{c} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b} = \lambda(1, -2, 3) + \mu(3, -1, 4) = (\lambda + 3\mu, -2\lambda - \mu, 3\lambda + 4\mu)$.

2. a) A partir de la definición de dependencia lineal de vectores, demuestra que los vectores $\{(1, 0, -1), (0, 1, 2), (1, -1, 1)\}$ son linealmente independientes.

b) Expresa el vector $\vec{v} = (3, -2, 3)$ en función de los vectores anteriores.

Solución:

Debe comprobarse que la relación $\lambda_1(1, 0, -1) + \lambda_2(0, 1, 2) + \lambda_3(1, -1, 1) = (0, 0, 0)$ sólo se cumple cuando $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 0$ y $\lambda_3 = 0$.

En efecto:

$$\lambda_1(1, 0, -1) + \lambda_2(0, 1, 2) + \lambda_3(1, -1, 1) = (0, 0, 0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\lambda_1 + \lambda_3, \lambda_2 - \lambda_3, -\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3) = (0, 0, 0) \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ -\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\text{Por Gauss}) \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \end{cases} \xrightarrow{E3 + E1} \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ 4\lambda_3 = 0 \end{cases} \xrightarrow{E3 - 2E2} \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ 4\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Cuya única solución es $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 0$ y $\lambda_3 = 0$.

b) Como los vectores anteriores son linealmente independientes constituyen una base de $\mathbf{R}^3$; en consecuencia, cualquier vector depende linealmente de ellos.

En este caso, hay que encontrar los valores de λ_1 , λ_2 y λ_3 tales que:

$$(3, -2, 3) = \lambda_1(1, 0, -1) + \lambda_2(0, 1, 2) + \lambda_3(1, -1, 1)$$

$$\text{Esto es: } \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 3 \\ \lambda_2 - \lambda_3 = -2 \\ -\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 = 3 \end{cases} \xrightarrow{E3 + E1} \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 3 \\ \lambda_2 - \lambda_3 = -2 \\ 2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 3 \\ \lambda_2 - \lambda_3 = -2 \\ 4\lambda_3 = 10 \end{cases} \Rightarrow \lambda_3 = 5/2, \lambda_2 = 1/2 \text{ y } \lambda_1 = 1/2$$

$$\text{Luego, } (3, -2, 3) = \frac{1}{2}(1, 0, -1) + \frac{1}{2}(0, 1, 2) + \frac{5}{2}(1, -1, 1).$$

3. Dados los puntos $A(1, 0, -1)$, $B(2, 1, 0)$, $C(0, 0, -1)$ y $D(-1, 1, 1)$, halla los vectores $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ y $\overrightarrow{CD}$. Comprueba si son linealmente dependientes o no. Da una interpretación geométrica del hecho.

Solución:

Los vectores $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ y $\overrightarrow{CD}$ son:

$$\overrightarrow{AB} = (2, 1, 0) - (1, 0, -1) = (1, 1, 1)$$

$$\overrightarrow{BC} = (0, 0, -1) - (2, 1, 0) = (-2, -1, -1)$$

$$\overrightarrow{CD} = (-1, 1, 1) - (0, 0, -1) = (-1, 1, 2)$$

Para ver si son linealmente independientes se hace el determinante,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 + 5 - 3 \neq 0$$

Al ser distinto de 0, los vectores son linealmente independientes. Eso significa que no hay ningún plano que contenga a los cuatro puntos, que los vectores no son coplanarios.

4. Para los vectores $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ y $\overrightarrow{CD}$, del ejercicio anterior, halla:

a) El módulo de cada uno de ellos.

b) El producto escalar $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

c) El ángulo que forman $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BC}$.

Solución:

a) $\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1) \Rightarrow |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$.

$$\overrightarrow{BC} = (-2, -1, -1) \Rightarrow |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$$

$$\overrightarrow{CD} = (-1, 1, 2) \Rightarrow |\overrightarrow{CD}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6}$$

b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = (1, 1, 1) \cdot (-2, -1, -1) = -2 - 1 - 1 = -4$.

c) $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{-4}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{6}} = \frac{-4}{3\sqrt{2}} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \text{ángulo}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) = 160,53^\circ; \text{ o mejor, } 180^\circ - 160,53^\circ = 19,47^\circ$$

5. Calcula los valores de a y b para que los puntos $A(1, 1, 1)$, $B(a, 2, b)$ y $C(1, 0, 0)$ estén alineados.

Solución:

Los puntos A , B y C están alineados cuando los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ son proporcionales. Esto es, cuando $\overrightarrow{AB} = k \cdot \overrightarrow{AC}$

Como $\overrightarrow{AB} = (a, 2, b) - (1, 1, 1) = (a - 1, 1, b - 1)$, y

$\overrightarrow{AC} = (1, 0, 0) - (1, 1, 1) = (0, -1, -1)$, debe cumplirse que:

$$(a - 1, 1, b - 1) = k \cdot (0, -1, -1) = (0, -k, -k) \Rightarrow \begin{cases} a - 1 = 0 \\ 1 = -k \Rightarrow k = -1; a = 1; b = 2. \\ b - 1 = -k \end{cases}$$

6. Estudia la dependencia o independencia lineal de los vectores

$$\vec{u} = (2, 0, 9), \vec{v} = (3, -1, 2), \vec{w} = (5, -1, 4)$$

Solución:

Los vectores serán linealmente independientes si su determinante asociado es distinto de cero; en caso contrario serán linealmente dependientes.

$$\text{Como } \begin{vmatrix} 2 & 0 & 9 \\ 3 & -1 & 2 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 14 \neq 0, \text{ los vectores dados son linealmente independientes.}$$

7. a) Estudia, en función del valor del parámetro a , la dependencia e independencia lineal de los vectores $\vec{v}_1 = (a, -a, 1)$, $\vec{v}_2 = (2a, 1, 1)$ y $\vec{v}_3 = (1, -1, -1)$.

b) Cuando sean linealmente dependientes, escribe $\vec{v}_3$ como combinación lineal de $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$.

Solución:

$$\text{a) Como } \begin{vmatrix} a & -a & 1 \\ 2a & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -2a^2 - 3a - 1 = 0 \Rightarrow a = -1 \text{ o } a = -1/2$$

Por tanto:

Si $a = -1$ o $a = -1/2$ los vectores son linealmente dependientes $\rightarrow$ El determinante vale 0.

Si $a \neq -1$ y $a \neq -1/2$ los vectores son linealmente independientes.

b) Para $a = -1$, los vectores son: $\vec{v}_1 = (-1, 1, 1)$, $\vec{v}_2 = (-2, 1, 1)$ y $\vec{v}_3 = (1, -1, -1)$.

$$\text{Luego: } \vec{v}_3 = -\vec{v}_1 + 0 \cdot \vec{v}_2 = -\vec{v}_1.$$

Para $a = -1/2$, los vectores son: $\vec{v}_1 = (-1/2, 1/2, 1)$, $\vec{v}_2 = (-1, 1, 1)$ y $\vec{v}_3 = (1, -1, -1)$.

$$\text{Luego: } \vec{v}_3 = 0 \cdot \vec{v}_1 - \vec{v}_2 = -\vec{v}_2$$

8. Halla la relación que debe existir entre a y b para que los puntos de coordenadas $A(1, 0, 0)$, $B(a, b, 0)$, $C(a, 0, b)$ y $D(0, a, b)$ estén en un plano.

Solución:

Cuatro puntos pertenecen a un mismo plano cuando tres de los vectores que determinan son linealmente dependientes.

Si $A(1, 0, 0)$, $B(a, b, 0)$, $C(a, 0, b)$ y $D(0, a, b)$, los vectores $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ y $\vec{AD}$ son:

$$\vec{AB} = (a, b, 0) - (1, 0, 0) = (a-1, b, 0)$$

$$\vec{AC} = (a, 0, b) - (1, 0, 0) = (a-1, 0, b)$$

$$\vec{AD} = (0, a, b) - (1, 0, 0) = (-1, a, b)$$

$$\text{Serán linealmente dependientes si } \begin{vmatrix} a-1 & b & 0 \\ a-1 & 0 & b \\ -1 & a & b \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -(a-1)ab - b[(a-1)b + b] = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -a^2b + ab - b^2a = 0 \Leftrightarrow ab(a+b-1) = 0$$

Las soluciones de esta ecuación son: $a = 0$, $b = 0$ o $a + b = 1$.

Por tanto, los cuatro puntos dados estarán en un plano cuando $a = 0$, $b = 0$ o $a + b = 1$.

Si $a = 0$ los puntos son: $(1, 0, 0)$, $(0, b, 0)$, $(0, 0, b)$ y $(0, 0, b)$; los dos últimos coinciden.

Si $b = 0$ los puntos son: $(1, 0, 0)$, $(a, 0, 0)$, $(a, 0, 0)$ y $(0, a, 0)$; coinciden otros dos.

Luego, para que los cuatro puntos sean distintos y estén en el mismo plano es necesario que $a + b = 1$, con a y b distintos de 0.

Aplicaciones del producto escalar, vectorial y mixto

9. a) Calcula el ángulo que forman los vectores $\vec{u} = (2, 1, 1)$ y $\vec{v} = (-1, 1, 1)$.
 b) ¿Cuánto debe valer a para que los vectores $\vec{u} = (2, a, 1)$ y $\vec{v} = (-1, a, 1)$ sean perpendiculares.

Solución:

- a) El coseno del ángulo que forman los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ viene dado por:

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{(2, 1, 1) \cdot (-1, 1, 1)}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{0}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{3}} = 0$$

Los vectores son perpendiculares.

- b) Su producto escalar deber ser 0: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Luego,

$$(2, a, 1) \cdot (-1, a, 1) = 0 \Rightarrow -2 + a^2 + 1 = 0 \Rightarrow a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm 1$$

10. Dados los puntos $A(1, 0, -1)$, $B(2, 1, 0)$ y $C(0, 0, -1)$, determina otro punto D de manera que $ABCD$ sean vértices consecutivos de un paralelogramo. Determina el punto de corte de sus diagonales y el área de ese paralelogramo.

Solución:

Si $ABCD$ son vértices consecutivos de un paralelogramo, debe cumplirse que los vectores libres $\vec{AB}$ y $\vec{DC}$ sean iguales.

Si $D = (a, b, c)$, $\vec{DC} \Rightarrow (0, 0, -1) - (a, b, c) = (-a, -b, -1 - c)$

Como $\vec{AB} = (1, 1, 1)$, entonces:

$$(1, 1, 1) = (-a, -b, -1 - c) \Rightarrow D = (-1, -1, -2).$$

El punto de corte de sus diagonales coincide con el punto medio de una de ellas, por ejemplo la diagonal AC . Sus coordenadas son:

$$M = \left(\frac{1+0}{2}, \frac{0}{2}, \frac{-1-1}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}, 0, -1 \right).$$

El área del paralelogramo es igual al módulo del producto vectorial de dos de los vectores de determinan sus lados: $S = |\vec{AB} \times \vec{AD}|$.

$$\text{Por tanto: } |\vec{AB} \times \vec{AD}| = \begin{vmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \vec{u}_3 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (0, -1, 1) \rightarrow S = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2} \text{ u}^2.$$

11. Dados los vectores $\vec{v} = (1, 0, -1)$ y $\vec{w} = (1, 1, 0)$, calcula los vectores unitarios de $\mathbf{R}^3$ que son ortogonales a ambos.

Solución:

Un vector ortogonal a dos dados se obtiene multiplicándolos vectorialmente.

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \vec{u}_3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (1, -1, 1)$$

Este vector es perpendicular a $\vec{v}$ y $\vec{w}$, pues los productos escalares:

$$(1, 0, -1) \cdot (1, -1, 1) = 1 + 0 - 1 = 0$$

$$(1, 1, 0) \cdot (1, -1, 1) = 1 - 1 + 0 = 0$$

Un vector unitario en la dirección de uno dado, $\vec{a}$, es $\frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a}$. En este caso, los vectores

unitarios pedidos serán: $\pm \frac{\vec{v} \times \vec{w}}{|\vec{v} \times \vec{w}|} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1) = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$.

12. a) Demuestra que los puntos $A(\lambda, 2, \lambda)$, $B(2, -\lambda, 0)$ y $C(\lambda, 0, \lambda + 2)$ son vértices de un triángulo isósceles.

b) Para $\lambda = 2$ determina su área.

c) Para $\lambda = 0$, si los puntos A , B y C se trasladan según el vector $\vec{v} = (1, -1, 3)$ se obtiene un prisma triangular. Halla los nuevos vértices y el volumen del prisma.

Solución:

a) Un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales. Por tanto, en este caso, habrá que ver que el módulo de dos de los vectores $\vec{AB} = (2 - \lambda, -\lambda - 2, -\lambda)$, $\vec{AC} = (0, -2, 2)$ y $\vec{BC} = (\lambda - 2, \lambda, \lambda + 2)$ es el mismo.

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(2 - \lambda)^2 + (-\lambda - 2)^2 + (-\lambda)^2} = \sqrt{3\lambda^2 + 8}$$

$$|\vec{AC}| = \sqrt{0^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8}$$

$$|\vec{BC}| = \sqrt{(\lambda - 2)^2 + \lambda^2 + (\lambda + 2)^2} = \sqrt{3\lambda^2 + 8}$$

Como resulta evidente, los lados AB y BC miden lo mismo. Por tanto, el triángulo será isósceles; y para $\lambda = 0$, equilátero.

b) Si $\lambda = 2$: $\vec{AB} = (0, -4, -2)$, $\vec{AC} = (0, -2, 2)$ y $\vec{BC} = (0, 2, 4)$.

El área del triángulo viene dada por $S = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$.

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \vec{u}_3 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} = (-12, 0, 0) \Rightarrow |\vec{AB} \times \vec{AC}| = 12 \Rightarrow S = 6 \text{ u}^2.$$

c) Si $\lambda = 0$, los puntos son: $A(0, 2, 0)$, $B(2, 0, 0)$ y $C(0, 0, 2)$; y los trasladados serán:

$$A' \rightarrow (0, 2, 0) + (1, -1, 3) = (1, 1, 3);$$

$$B' \rightarrow (2, 0, 0) + (1, -1, 3) = (3, -1, 3);$$

$$C' \rightarrow (0, 0, 2) + (1, -1, 3) = (1, -1, 5).$$

Además: $\vec{AB} = (2, -2, 0)$, $\vec{AC} = (0, -2, 2)$ y $\vec{AA'} = \vec{v} = (1, -1, 3)$.

El volumen del prisma triangular vale la mitad que el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ y $\vec{AA'}$.

Será:

$$V = \frac{1}{2} \left[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AA'} \right] = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |2(-6+2) + 2(-2)| = 6 \text{ u}^3.$$

13. Determina el valor de a para que los puntos $A(1, 0, 1)$, $B(1, 1, 1)$ y $C(1, 6, a)$ sean los vértices de un triángulo de área $3/2$.

Solución:

El área del triángulo que determinan los puntos A , B y C viene dada por $S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$

En este caso:

$$\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1) - (1, 0, 1) = (0, 1, 0); \quad \overrightarrow{AC} = (1, 6, a) - (1, 0, 1) = (0, 6, a - 1)$$

Luego

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \vec{u}_3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & a-1 \end{vmatrix} = (a-1, 0, 0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{(a-1)^2} = \pm(a-1) \text{ y } S = \frac{1}{2}|a-1|$$

Como se desea que $S = 3/2$, y teniendo en cuenta que el valor absoluto presenta dos posibilidades, se tendrá:

$$\frac{1}{2}(a-1) = \frac{3}{2} \Rightarrow a = 4; \quad \frac{1}{2}(1-a) = \frac{3}{2} \Rightarrow a = -2$$

Por tanto, el triángulo tiene área $3/2$ si $a = 4$ o $a = -2$.

14. (Propuesto en Selectividad, Madrid 2012)

Dados los puntos $P_1(1, 3, -1)$, $P_2(a, 2, 0)$, $P_3(1, 5, 4)$ y $P_4(2, 0, 2)$, se pide:

a) Hallar el valor de a para que los cuatro puntos estén en el mismo plano.

b) Hallar los valores de a para que el tetraedro con vértices en P_1, P_2, P_3, P_4 tenga volumen igual a 7.

Solución:

a) Los puntos P_1, P_2, P_3, P_4 están en el mismo plano si los vectores P_1P_2, P_1P_3 y P_1P_4 son linealmente dependientes.

Esos vectores son:

$$P_1P_2 = (a, 2, 0) - (1, 3, -1) = (a-1, -1, 1);$$

$$P_1P_3 = (1, 5, 4) - (1, 3, -1) = (0, 2, 5)$$

$$P_1P_4 = (2, 0, 2) - (1, 3, -1) = (1, -3, 3).$$

Serán linealmente dependientes cuando $\begin{vmatrix} a-1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & -3 & 3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 21a - 28 = 0 \Rightarrow a = \frac{4}{3}$.

b) El volumen del tetraedro es un sexto del producto mixto de los vectores P_1P_2, P_1P_3 y P_1P_4 . Su valor es:

$$V = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} \overrightarrow{P_1P_2} & \overrightarrow{P_1P_3} & \overrightarrow{P_1P_4} \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} a-1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & -3 & 3 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} |21a - 21 - 7| = \frac{1}{6} |21a - 28| = 7$$

Dos soluciones:

$$\frac{1}{6}(21a - 28) = 7 \Rightarrow a = \frac{70}{21} = \frac{10}{3}; \text{ o bien, } \frac{1}{6}(-21a + 28) = 7 \Rightarrow a = -\frac{14}{21} = -\frac{2}{3}$$

15. Dados los vectores: $\vec{a} = (2, -1, 4)$ y $\vec{b} = (0, 3, \lambda)$ con $\lambda \in \mathbf{R}$.

a) Halla el valor de λ para que $\vec{a}$ y $\vec{b}$ sean ortogonales.

b) Para $\lambda = 0$ calcula el área del paralelogramo que tiene por lados los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$.

Solución:

a) Dos vectores son ortogonales cuando su producto escalar vale 0.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2, -1, 4) \cdot (0, 3, \lambda) = -3 + 4\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{3}{4}$$

b) El área del paralelogramo que determinan los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ viene dada por el módulo del producto vectorial los vectores $\vec{a} \times \vec{b}$.

Para $\lambda = 0$, $\vec{b} = (0, 3, 0)$, luego:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \vec{u}_3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix} = (-12, 0, 6) \Rightarrow |\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{(-12)^2 + 6^2} = \sqrt{180}$$

El área del paralelogramo vale $\sqrt{180} \text{ u}^2$.

16. Dados los puntos $A(1, 2, 1)$, $B(2, 3, 1)$, $C(0, 5, 3)$ y $D(-1, 4, 3)$.

a) Prueba que los cuatro puntos están en el mismo plano.

b) Demuestra que el polígono de vértices consecutivos $ABCD$ es rectángulo.

c) Calcula el área de dicho rectángulo.

Solución:

a) Los cuatro puntos pertenecerán al mismo plano si los vectores $\mathbf{AB}$, $\mathbf{AC}$ y $\mathbf{AD}$ son linealmente dependientes.

Estos vectores son:

$$\mathbf{AB} = (2, 3, 1) - (1, 2, 1) = (1, 1, 0);$$

$$\mathbf{AC} = (2, 3, 1) - (1, 2, 1) = (-1, 3, 2)$$

$$\mathbf{AD} = (-1, 4, 3) - (1, 2, 1) = (-2, 2, 2)$$

Como $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$, los vectores, efectivamente, son linealmente dependientes.

b) El cuadrilátero será rectángulo si los vectores $\mathbf{AB}$ y $\mathbf{BC}$, y $\mathbf{AB}$ y $\mathbf{AD}$ son perpendiculares. Por tanto, sus productos escalares deben valer 0.

Como $\mathbf{AB} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{BC} = (-2, 2, 2)$ y $\mathbf{AD} = (-2, 2, 2)$, se tiene:

$$\mathbf{AB} \cdot \mathbf{BC} = \mathbf{AB} \cdot \mathbf{AD} = (1, 1, 0) \cdot (-2, 2, 2) = 0$$

Por tanto, se trata de un rectángulo.

c) Por tratarse de un rectángulo, su superficie se halla multiplicando su base por su altura. La base puede ser el módulo de $\mathbf{AB}$; la altura, el módulo de $\mathbf{AD}$.

$$|\overline{\mathbf{AB}}| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}; \quad |\overline{\mathbf{AD}}| = \sqrt{4+4+4} = \sqrt{12}$$

Por tanto,

$$S = |\overline{\mathbf{AB}}| \cdot |\overline{\mathbf{AD}}| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{24} \text{ u}^2.$$

Observación: La superficie también podría hallarse mediante el producto vectorial.